

三

農

紀

三才經卷之四

古蜀

張宗法師京

小引

天地生成自得其情各且一理正以正氣為本氣味相和一類親從是以陰陽分而萬物吉惡分天知其自然故易云乾道變化各正性命

神農始嘗草別曰穀教民耕藉黃帝初治嘉穀使人火食周禮職方辨九州之穀地官辨土宜植藝穀蔬然穀以養命菜以輔穀天之水旱不時五穀不登菜茹亦可以療饑

藝法

凡種菜必先燥曝其子地不厭良薄即糞之鋤不厭頻旱

即灌之用力既多收利必倍甚豈畦蒔宜區

畦種

地長丈餘廣二尺未種先幾日斫起宿土雜以蒿草火療之以絕虫患并得爲糞臨種蒸以土糞

區種

長廣可丈許治極熟臨種時以熟糞和土拌勻鋪于區中俟苗出視稀稠去留

芽種

以子水淘淨頓匏中覆以濕草三日後芽生長一二分然後下種先以熟土內以水飲飽勻摻芽種復篩細糞上覆之以防日晒此法菜既止齊種又生

凡菜生虫用苦參根浸水潑百部水亦可或撒石灰

治菜易生

菜子三伏中曬乾過須雜麻莖內心播之可速生臨一年
即長一寸晒過二年即長二寸若幾許年即長幾許寸芳
譜云以錫于一箇擊一竅去蒿白紹菜子于內紙封固與
雞伏易園十九日令其數足播濕地須臾生長

解菜毒

受諸菜毒服小兒溺可解或甘草或貝母爲末湯調服即
解之

圃神

清異錄唐進士于則客遊于野見柴荆一株甚茂則烹茶
爲賞置一盃祀之夜夢一紫衣人曰吾王蔬菜之屬性嗜
茶好詩早蒙賜飲可謂知己之遇因贈以詩酬之則記于
其家疏圃祀之自是年年收倍

芥

冠圖經云青芥菜如菰而有毛紫芥菜莖紫赤白芥莖空
柔脆花白子白可入藥刻稷芥菜形絲割又有南芥刺芥
腋芥馬芥石芥花芥蔓芥皺芥皆菜之美者芥類幾多心
嫩者爲芥藍食之脆美花黃四瓣如芸苔而小結莢一二
寸子如蘇子色澤地黃可蔬食製乾能留久方士記名臘
菜其氣辛味辣有芥然之義字說云芥百界也發汗散氣

界我者也。埤雅云：望梅生津，食芥齋戒，五液之自外至者也。暴而涎垂，愧而汗出，五液之自內至者也。芥性辛烈，食者不得過啖，一介不與，一介不取，故字從之。

植藝擇肥熟土，治畦寒露前下種，苗生，糞水頻澆，四五寸栽成區，鋤耘澆以糞水，易茂。亦有春種者，三月子熟，但各處氣候不一，須因其宜而時治之。

製食：茂時，取糜苔沸水焯入鹽少許，趁熱入器內，覆白次日，即可食。再入以香油鹽醋，其味辛美。又曬乾可久食。或以芥子末拌入，甚辛美。法芥末法：芥子焙乾研末，沸水調盂中，覆烟火上薰，片刻又覆地土，其味辛辣，可調蔬肉，辛美甚佳。

本性味辛氣溫溫中下氣豁痰利膈李時珍云但味辛而散不可久服耗人真氣

効方白翳芥子一粒輕手援于目中少頃以共花水鷄子清洗 女人月閉踰年寒熱往來腹滿腰臍痛白芥子炒二兩為末每食前服一錢熱酒下 兒乳癖白芥子

研末水調攤膏貼之以平為期



漢書夏侯勝口人患經面不能言明若能言明取青紫如挽地拾芥耳○朱書蘇易簡對太宗目物無定味適口者珍臣止知弊汁為美臣憶一夕寒甚撓爐痛飲夜半吻燥中庭月明殘雪中覆一簪真逆效莖臣此時謂上界仙厨寒猶易貼殆恐不及寒欲作水壺先生傳因循未果○後漢書張仲余為廣陵太守舉吳奉為者廉仲宗罷歸金幣為禮仲宗不受奉以囊盛投仲宗芥園中而去仲宗後為至廣陵而還集白芥

白菜圖經云：紫青白嫩有種，白莖扁薄者有種，白莖圓結者至老無消，衛心而生春深開小黃花，結角如芥。雲夢云：白子大而灰有種，名黃芽。白莖扁葉，束心帶微黃，莖葉并長，以初吐有黃色故名之。南方留畦過冬，北方寒冽入窖。白菜者，名其色也。爾雅云：菰，陳雅云：四時常見，臨冬晚華。凡菜臨冬霜而能茂者，俱奇菰之謂。

下菰，敗子不宜太老，宜帶微花去，稍角留根，角每角亦去其稍留中，取子生苗，佳否則變形。三伏加異與土和，秋初作畦，掘穴相去七八寸許，填熟糞于內，候五六日，將子三四粒點之，至苗高三四寸時，每穴止留美者一科，再擇其去苗之美者，當斷根尾，下鬚移栽。他土肥畦須

根端苗正相離八九寸或一尺一科糞水頻澆馬矢護根將草拔束菜腰勿令散展如是則茂而美夏亦可種但生出不耐久每根有重十餘斤者有重一斗斤者乃物理士宜故也

木性味甘氣溫快中除煩解酒利水煮食良病足者有禁夏種者發瘡風壯盛者勿論

効方漆瘡以生白菜搥敷或煎水洗酒醉不醒者白

菜子二合初末井水調二服即效



類聚云崔寔好賓客盛修役體彈壓茲法不問餘產

居常惟食菜羹而已○聞見錄兩山先生謂每歲種菜莫梓菜果而已○升庵集或問陽道曰王莽之學後王之王之學猶菜羹也人情食脂炙久而忘菜羹矣

青菜

青菜菜大苗高青莖可愛有種色粉而光青者有種色紫而莖細者有扁莖桔莖二本深春抽苔莖高七八尺開花結子與芥不異春中采之可醃可乾通志云春不老王夷云馬面菘青者色名也凡菜見霜更味惟此菜不遇霜味苦澁一遇霜味甘美故云冬末晚菘


植莖七月擇肥土作畦種子苗生長三五寸移栽相去尺餘一科糞水頻澆勤鋤土鬆勿令乾燥采外葉爲蔬留心令發至春入將苔時刈之可造乾菜里蔬水醃菜能留久

性味甘氣寒和氣血快腸胃熟可潤肌生能豁痰子能

降氣暈素堪食古人傷寒後禁食恐耗虛耳

刻方小兒肌瘦不時發熱青菜煎水洗 胸膈不快炒青

菜子爲木薑湯調服

 青薑 江泌性仁孝每食菜不食心以其有生意惟食

有二獵者往求食以菜粥與二獵者云惟無魚胸泰

立前案大呼曰子八山中四十年

養如斯性態耶其人悔悟而漸甚

菠菜圖經云莖柔脆中空葉綠脈軟厚傷出兩尖直出兩

尖根赤長數寸春末起苔尺許開碎白花有雌雄離者

種實有茨如蒺藜子樣雄者則否根葉可葷可素皆脆美

製乾留以食方土記荊極菜廣志云赤根菘食經云鵝

蔬名魚其形呼其產也始出自西域菠陵國今訛爲菠
稜呼者乃聲之轉也

種蔬時將子水浸二三日撈出控乾停瓠覆罩候并生
揀肥地作畦勻種之宜末旬下種勤澆可以旋食秋社
內種者主將霜厚加馬糞辟水寒可无冬蔬此菜必過
月乃生即晦日下種與先種十餘日者同生春種者多
虫雄者田多弱雌者苗多茂擇雌者留種亦問留雄者
一兩利

本性味甘寒開腦下氣却熱止渴服丹石人最宜南人
飯魚稻食之適冷北人無忌與鮓魚同食發蠱亂

効方消渴飲水日至石餘者用菠菜根鷄內金等分爲末

每二錢日三服大腸澀滯及病瘳者常食菠薐自然

通利

興

唐書太宗時有尼波羅國獻菠薐火食能益食味一

康侯聞之擊節美賞其說○列女信○廣漢汲教夫婦
將產奴讓兄盡有只留園地足一日種菜得金一詔
妻曰本言讓金乃先祖所有此獨非
其有耶教曰固吾意也遂以金遺兄

蒿苳

蒿苳圖經云葉如蒿筍而鍛澤白潔嫩斷之有乳老則起

莖花真如初綻野菊成攢旋開結子花罷萼欽子有毛

隨花飄落食經云生菜不離園宜生按食脆美唐書春設

春餅生菜名春盤異物志云紫苳和土作器火煨如銅故

石苳本草云其廣植花果蔬圃中遠蛇虫蠅可采葉長

可采以日供食用春菜之最者莫若此也

種藝百露下種九月栽花初收時采其子先擇肥熟土治作畦水飲足以子勻撒之上以細灰糞蓋荷生永頻澆長三四寸移栽成區相去六七寸一坵九常澆勤耘春種者亦佳

本性味苦氣寒益心和血止煩消熱有宿冷者勿多食無者不禁

効方彭乘云苜有毒百虫不敢近蛇虺觸之目膜不見人受其毒薑汁解 虫入耳苜草葉搗汁滴耳中白出乾葉雄黃爲末麴糊丸如棗核蘸生油塞耳 沙虫蝕苜草葉搗汁塗

興改

唐書李白母淘萊溪邊一赤鯉羅監中食之遂孕生
自白以詩題酒隱堂自題云青蓮居士謂仙人酒肆
人間三十春胡州司馬何須問金粟
如來是後身後人稱為詩中神仙

萵筍

萵筍圖經云葉似白苣而尖長嫩多皺色微青而之有白
汁四月抽苦高二三尺葉生衛苦刈之名曰筍郭且籍外
皮內肉嫩脆可生食可煑食可量可素其味清美醃薑
宜人人可愛廣雅云千金菜豈虛譽

植莖種同白苣栽宜肥潤土頻澆糞水生筍長大但葉
糙苦不若筍良

本性味甘氣涼清心潤肝爽口利膈

効方身搔痒難已收葉煮湯洗之

日柳爲布衣時過五家送不出門食不遺菜今
送之是貴貴而賤賤而心所安○某子友足推之不去聞
沈某下邳水是有三節大竹流于友足推之不去聞
有兒散持歸破得男養大有武
才遂雄有狹後以氏竹爲姓

苦蕒

黃圖經云葉綠帶碧狹而長六七寸苦起爲莖老則中
空斷之有白汁苦高三四尺花如蒿莖旋開一花結子二
叢花收萼欹子生白毛隨風飄落卽生北方至冬而凋南
方者冬夏常青爲少異耳

植栽三四月肥土治畦種子苗生常澆深三四寸移栽他
區排五成行

本性味苦氣寒益心和血忌與鹽同食作痔脾胃虛寒人

不可多食惟暑月宜蔬

効方中沙虫毒及河澗中洗浴覺皮膚赤熱刺痛如豆黍

寒熱發瘡入骨殺人先以芒葉刮去毒後苦苣葉搗塗

鶴林玉露云

百姓有菜色正綠土大夫不知菜味也

過菜與菜色而已

菘菜

菘菜圖經云葉青莖白似白菜狀而短小四月開細白花如茱萸而輕虛土黃色內有細子葉作煮食微有土氣勞譜云甜菜老圃云厚匹菜又云土松廣雅云菘蓬老菘葉燒灰淋汁洗垢表潔淨濯白服益暖若玉貌

植菘春時治種苗長移栽糞水頻澆茂南方秋種噓畦過

冬臨春鋤澆苗更茂

本性味甘苦氣寒補中下氣開胃通腸婦人宜之但氣冷不可多食患腹冷

効方痔漏下血蒼蓮子芸苔子荳蔻子蒿苳子蔓菁子萊菔荊芥子大慈子各等用鮑魚一尾去鱗因開入藥在內縫合入銀器中土下合炙火煉熟放涼為末每服二錢朱飲下

興

言書菜容耕于野避南危坐郭林宗見而異之遂與言林宗宿容家殺雞為饌林宗以為已設饌而供其母自以草蔬與客同身林宗敬服起拜曰吾友也

莧菜

莧圖經云苗初生如蓼藍狀有紅有青有花葉如白果葉

者老則起苔開細花成穗穗細而子扁黑與青箱子同嫩時煮食無渣極柔賦一家言食莧須宿食味更佳新煮畧有土氣理雅云廣方士記云莧有五色葉莖高大易見故名莧易決五爻莧陸夫夬傳曰青泥殺蠶得莧復生今人食猶忘莧其以此乎

植莧熟工作畦以細糞散土面剷治與土和候清明前後下種再以灰糞薄覆苗出去草淨清糞水頻澆旋食旋扯其苗移栽更勝采芽復生茂六月生出食之殺人復種秋中可食

本性味甘氣寒除邪去寒熱子可明目赤入血分白者入氣分五色者殺山毒射工多食動氣冷中忌與蟹肉食

成賢癰

効方蜂蠆瘡傷莧菜援擦之可解漆瘡疔毒洗之小兒口

瘰癧者用曰紅者用紅以莧梗燒灰米泔洗後敷灰

要按解人願康節邵先生養性歌云紅莧菜白鹽炒只要

按得肚皮飽若因滋味妄貪求雖多餉即討煩惱○

二孟肉一孟人識其客齋黃齋直日子膳非客乃儉


菜莧

菜莧方士記名千穰穀農人呼漫穗子有青紅二種藥莖
枝桔畧與莧同但質糙味淡不若莧美苗葉飼豕易肥摘
即復生子繁多如粟米而扁炒食香同脂麻粘饅飴甚佳
可碾麪爲饑荒年充饑故有或之名

植莖揀肥土種子苗生移植糞水頻澆勤鋤戊老刈收其子以備用

〔本性〕味甘氣涼疏氣暢血宜忌與苋同

〔効方〕暴痢紅者用紅白者用白攪汁和蜜湯飲

〔圖〕 豫章記宋寧種蔬三十名時雨之後按行園圃曰天苗此徒助我胃俎充我腸腑此外無他味

馬齒莧

馬齒莧圖經云桑莖布地葉對生北莖圓整如馬齒秋開細花結小實中細子如葶藶子狀苗煮熟曬乾可作蔬大者爲純耳草小者爲鼠齒草小者節中有水銀每草十斤可得八兩名木禾煉家珍之苗衣難蔽得槐木爲架晒易煉家書名五行草五方草九頭獅子草廣志云長命草

其目也馬世有象其形也

〔種〕甄子春深漫種園中落土易生鋤草淨茂時收以水
焯晒乾爲蔬

〔本性〕眠酸氣寒殺虫去惡瘡化毒六月六日采之晒乾元
旦煮食免疫

〔効方〕李絳手集唐武相元衡甚脛瘡百藥因效有史者上
一方以馬齒莧搗爛敷之 雜物眵眼采馬齒莧懸

東壁陰乾燒爲末點眼少許從眥出 骨疼痛不拘風

濕及女人月家病乾馬齒莧一斤濕一斤五加皮半斤

蒼朮四兩其搗碎煎湯洗澡急用薑葱搗冲熱湯三盃

飲之于煖處取汗痛立止然後用藥調理 痲痕馬

齒莫煮水日洗之



石隱記許遜舉孝廉為旌陽令慕道以晉室亂棄官
師吳猛猛以木永生錯諫神丹之法授許至太康二
年八月二十一日于洪州西
山與家二十一日按宅上升

薤菜

薤菜圖經云薤菜如蔓中空葉若菠薐菜及懸頭菜粉白
花如牽牛花狀結實如梧桐子大黑白色苗可旱可水蔬
隨骨素南方編薤為筏作小空浮水土種薤于內長成莖
苗皆出羣孔中逐水上下始產海外洋人船上薤藏移入
中土故取薤加草名之

〔植薤〕薤深治地作畦撒一苗生薤水常灌去草淨薤成采
食或薤破塘淺小處一茂

味甘淡性寒行血養氣醒脾解熱安食成治

効方并藥菜攪汁和酒服即見效

則心慈而性念善茹素則氣清而腸胃厚無瘕無食
固不由此

茼蒿

茼蒿圖經云葉綠形如刻缺微似白蒿苔一二尺花開深黃狀若單瓣菊花結子繁衍嫩作蔬佳美微老則不堪啖
茼者取其同干蒿也詩云呦呦鹿鳴食野之蒿人見鹿食而健是以收種圃爲蔬也

種熟肥地治畦春社秋社宜種澆以糞水苗茂
本性味苦氣寒調脾清水多食動風令人氣滿

効立遍身風痒及疥癬者煎水洗卽已



宋書文節張知爲相蔬食布衣或曰子太簡客也曰我一簞一食一家者我儉一儉一家儉儉所餘以及其窮放之人免受饑寒不負朝廷厚恩不負祖宗積德也

地膚

地膚圖經云一本叢生每窩衆枯團團直出有赤有黃葉若柳而狹小深綠七月開小黃花結子生青似初起眠蚕之形最繁嫩采茹食燥之日乾以備冬蔬八月薹幹成以草束其腰至老莖之可爲帚方士記地葵又名地麥本草名藍明又名落帚獨帚白地草處云草芳譜云于頭于干心妓南人呼爲玉簪北人予玉簪種種云名不過爾雅之

種子肥熟地中苗深移植可承元蔬老收子

人藥梗可掃地作蚕簇

木性味苦寒去熱除風助髓益精久服輕身耐老長壽
浴去皮膚風濕搔癢

効方補氣益力丈夫陽事不舉用地膚子湯心石脂為末

蜜煉治丸服 凡物傷晴現弩肉地膚子煎湯點洗

頭風痛不省人事者地膚子同薑塊爛熟酒沖服全汗

出自瘡

莊子

莊子孔子尼于陳蔡之間七日不火食食藜藿羹不慘

○家謂仲由曰昔者由也事親食藜藿菜而負米百里

之外親喪之後遊于楚從車百乘積粟萬鍾累卵而

日由也事親可謂生盡力死盡思者也

灰藜

灰藜圖經云藥尖形若刻缺而青背白心紅槩有細白灰食時搗蒿揉去灰沙枯高數尺秋開細花如簍中有黑子蒸曝取仁可炊飯及磨粉食救荒書云結莢成穗者味甘散者味苦生樹下牆邊者有毒唐志云金鎖天謂其葉有紫紅綿稜也方士記云胭脂菜本草云鶴頂紅乃苗之紅心者俗名灰藜菜老則莖可爲杖扶人

植藝精明後種畦中苗長栽之茂乃易生之菜

本性味甘氣涼去毒除風色白者謂此藜有毒同肉食生瘡以灰揉衣去油膩

効方白燬風紅灰藜蒼耳根莖各三斤晒乾燒灰水熬大

牛膝二兩和勻煉膏塗擦

羅客誦屏云羅可沙陽之預儒性度靜淡嘗有竊其
圖者適遇見却姓華問以保其去由是相識無犯
○自土婦云萍藻味以養氣去痰怒以
養性處卑下以養德守清靜以養道

蘿蔔

蘿蔔圖經云葉長尺餘形若燕青亦有若芥者春中抽
苔開小花有紫有白結莢寸餘子如麻子七八赤黃色圓而
微扁根有大小形有長圓色有紅白生沙壤者大而甘產
齊上者小而辣相葉可生食可熟食可煮羹或醬醋鹽糖
乾陶嬰爾雅云哭羅葩爾雅翼云蘆服一云蘿葩廣志云
土酥一名溫蒜食經云花薺廣雅云苞薺舊人各拉肥奈
大和蘿荷春曰地錐夏曰夏生秋曰蘿荷冬曰上酥古之

蘿藦中轉爲蘿服後世轉爲蘿蔔子名萊龍取其能制變
是就文而起義耳

植蘿頭伏下種宜砂土耜耕極熟得生地種之更良子陳
者佳先以熟糞勻布畦內以灰糞拌子勻撒露間細土
覆之苗生三四指擇其密者去之至葉五六寸勻其間
者旋勻旋食稀則根大須厚壅頻澆可常種常食鋤不
厭頻惟忌霜露生虫摘其心以土掩覆且大而肥美入
九月揀良者截去根鬚栽畦中離尺許一窠頻澆五月
收子作種其子中暗形稜種時良不去鬚者名蒲園花
子圓而滿只可入藥若種之則根小味苦藥平不起老
農云少種一畦畝減得十畝穀

本性味辛甘氣溫平快氣利膈去痰消穀同辛甘而功
抵人參與鮑魚煮食大補熟者多食滯腸動氣生薑可
解服地黃何首烏者白髮二性相友化氣養血故也

効方宋書云王荆公患頭暈道人傳方用生薑薑汁一蠅
仰臥隨左右注鼻中 張杲云饒州民李耆病鼻齋

甚危醫以薑薑汁無灰酒飲即止蓋血隨氣運氣滯而

血妄行取薑薑下氣也 見說云一人好食豆腐中毒

百方不效偶聞人家以薑細薑湯入豆腐釜中遂不成遠

飲薑薑効 范濟畧云中州一代迨久嗽微一老醫

年七十餘亦病久甚劇不得已而應命行村間扣民家

求飲以湯一盞與飲之臨兒快再求飲覺嗽止因問其何

湯藥云乃補腎乾者也驗求村人飽數升服數日病痊

及見代巡與已病同出前羅葡萄藥飲服數日病愈代巡

服其神醫以實告

建興錄鄭居易計部言其家自

先冬留帶甚重羅葡萄懸之上下至有十餘年者每至夏秋

月有病痢者煮水服即其灰更佳

得羅葡萄云李師者述一

人石篇中賦以烟薰正石撰

營不合于弟止其

復一見聞錄云丁廣善經

馬面甚可致干

年止合種火田王乳蘿葡萄城

兒紅裳少女引入

其小姑合歌云五德樓閣時

拾羅天府由來是此

病悵門懷說不盡一左也

火吾宮遇一達者

少女者心神也小姑者

也火者毀也廣雅言

實者羅葡萄也能解

以藥并羅葡萄飲

胡蘿蔔

胡蘿蔔元史云自外地移入中土葉嫩時狀如鶴掌時有
黃根長五六寸肌膚細膩色赤黃心如木春深蘿蔔皆
二三尺莖生白茸氣若薤其開碎白花攢簇如傘蓋其
似蛇床稍長褐色有毛可生食煮食可鹽可乾可救荒
種宜伏內擇肥熟土在區勻種之將土穰實勿令
虛苗生去其並密者相去四五寸根可肥大
本性味甘氣溫補中和脾元人和五味羊肉製補中益氣
甚于諸味

効方年老虛羸者羊肉和胡蘿蔔煮食雞豕肉亦佳有益
無損

金効攷此征錄云交河有沙蘿蔔長寸許味辛
而後苦氣若胡蘿蔔合食之可以充飢

菰

二圖經云菰青色高一二尺如初生嫩蘆而稍間苦箭竹
爾爾對生根嫩白老葉無花實至秋社前後新芽頗長
列指狀系食無勑芽微此系秋社後次霜降後老而有勑
畏濕怕水惡日故秋寒則無菰宜蓬陰蔽之可生熟食
浸鹽醃糟停蜜煎可蔬可果可調和可入藥春秋運斗
云璇星散而爲菰說文云菰作藎得濕物也字說云菰
強可樂百邪

菰沙土縱橫熟耕厚菰苗鋪種宜三月作畦溝廣一丈
短長隨之作龍壟相去一尺深五六寸壟中安一草菰
蓋以糞矢土壅再覆以草菰苗生有草即鋤漸加細土

覆之壘令高不得去上爲芽上生芽長後掘傍土掘看
老薑可食耘不厭頻宜造棚或插竹荻蔽日類以牛糞
浸水澆之茂

收薑不宿故十宜九十月手高阜所挖深窖以糠秕合
埋以作種至來春煖開窖取出去其敗者將薑積堆下
視以草用水澆以濕外塗以濕牛糞或泥漿傍留一竅類
澆水自芽生一二餘然後分瓣植畦

本性味辛氣溫通神明辟邪惡散風寒去痰濕留皮涼去
皮熱生熱熱和申月令云九月二十八日禁食入九月
多食損精力促壽又令人三春患目占云秋不食薑爲
辛走氣瀉氣故以禁夏月火旺宜汗散之故不禁如婦食

小薑令兒服此多食乾薑令胎內消病痔者兼酒食立
發人參多食而生惡肉夜忌食薑夜則氣斂反開發則
逆于道矣薑之土味蘿蔔下味薑薑辛甘藥中合用
不獨專于發散取能行津液而和榮衛若早行山谷宜取
薑一片含口中不犯霜露悉濕及山嵐瘴氣相感赤凡
醋薑瓶內人參殼雖老無筋又云核桃二枚槌碎安罐
底則薑不辣乃云以熟栗未搯上則薑無渣

効方禁方云治痢生薑切細好茶一兩在意呷之便瘥
痢留皮冷痢剉皮取薑能助陽茶助陰二物相和消惡
散毒此蘇東坡治文潞公咳嗽上氣乾薑炮薑乃法
皮于蛙者紫色桂心刮去皮等分共搗末煉蜜和作幾

千丸如梧子大每咳發服三丸禁食薑膩熱藥其效如神此劉禹錫方每治人不出方或謂其言曰凡人患咳多進涼劑若見此方必不肯服故出藥見效 婦人產後用力垂出肉線長四五尺觸之則痛引心腹欲絕時遇一道人云老翼連皮三斤搗爛入麻油二斤并勻炒乾先以熟絹五尺拈作方結令人暫輕盛起肉線使屈曲三圍納人產尸仍以絹袋盛置罍裏之冷則更換薰二

日夜縮入大半二日盡人此魏夫人秘傳怪病方

醫方

別傳則州劉表子琮候司馬微微劍齒左右司馬

微曰吾自稱是耶微歸州頭若憤出見方琮起拜則

錢置袖中須臾得蜀姜戲之即遁去

大蒜

大蒜圖經云藥若蘭莖若葱根若水仙八月分瓣蒔則當
月使生苗莖獨顯根白葉青牙莖可茹至次年春深抽苔
可生食熟食可酢酢能留人設不抽苔苔生花花中結實
亦戕小蒜可食可種每根裹包或四六瓣者或十餘瓣者
或獨顆者可醃可浸可提碎入鹽醋和蔬肉食辛美亮
者辣壳白者味之遜廣志名葫蘆繩云始白張鶴得種于
外地中國止有之蒜名蒿爾雜註云高山蒜也澤蒜也乃
其在于山石水端也字林云金中蒜也

種蒜地耕極熟時加灰糞者大且秋季治溝每畝相連三
五寸許再以糞掩之上加腐草密蓋省起煩也糞水三

月並起米之作蔬則粒小而實滿至小滿拔其根則連
顆而起過小滿則根敗雖破種裏不令日晒懸透風處
自乾種宜戊辰辛未戊申丙子辛丑己巳日一法八九
月治畦稠植候來春先以土鋤熟每畝糞數十石再鋤
勻以木棚插一竅栽不林以水灌之活出苗時以水澆
極大

本性味辛氣溫有小毒通臟腑達孔竅去寒濕除惡消癰
化積解暑遠嵐障辛能散氣溫能助火傷脾損目伐性
昏神有荏苒受之而不知者故煉形家以爲暈而禁食
義取薰烈之味生食增悲熟食生淫有損性靈故絕之
月令云三月勿食

効方泄瀉暴痢及禁口小兒大人以蒜搗貼兩足心亦可

貼臍中鼻血不止用蒜一枚去殼攪泥作錢大一枚

許左血貼左足心右血貼右足心兩鼻出血兩足心俱

足肚轉筋以蒜擦足心卽服一瓣水下
貼

取^鮮合皮截去兩頭不服數片各因炙腫疼以濕紙

貼尋瘡頭用大蒜十顆淡豆豉半合乳香一錢細研隨

瘡頭大小以製造圈圍定其藥末于肉二分厚著艾炷

之痛至癢癢至痛以百煎為度

謝安

幽雅正義云黃帝分置山遺書華毒至千危急得全
於乃解泰政情之○高十傳閱貢世橋館士周寧

性清潔自以鼎反也。黨見直食無禁遺以生。赫音我欲損煩今便作煩耳。愛而不食吞夢不至。照出

邑夫客于館
時人仰之

時人仰之

薤

薤圖經云始生廬山平澤有根圓如獨蒜者有形長若蔥
頭者其味少烈數枝一本蒸以葱而有稜二月起葉開小
紫花小滿前後出其根顆可烹可鹽可醃故內則蔥薤實
諸醢以菜之今人因曰薤本又作薤又韭類也帝辛之蔬
廣雅名鵝薤其體光滑露不可斫古人所以歌薤也物理
論云凡山生薤土中有金穗如栽與蒜同時宜肥熟土作
畦每顆相離五七寸以葶草或加灰葉去草淨春中抽
心苗則根顆肥大小滿前摘出爲束懸透風所
本性味辛苦氣溫溫中散氣活血行滯生則辛熱熟則扶
美種之不蠹食之有益老人宜之養生者資焉三七月

勿食生薤損目

効方小兒疳痢薤白生搗如泥以粳米粉和蜜作餅蒸熟
熱食人或奄忽而卒者此皆中惡也出以薤汗灌入鼻
中便省不效攤救 若飲壞薤白晒葉煮熱切食一大
束即隨出

薤

後漢書龐參為漢陽守郡人任參者有忠節參到先
候之堂不敢入但以薤一本水一盞置屏前抱小兒
當戶參思其微言曰水欲清吸也參
我擊強宗抱兒孫欲吾開門恤孤也

薤

薤園經云華白葉青中空而圓高尺餘初生曰葱針葉曰
薤曰表曰葱薤生曰葱曰葉內涕曰薤薤通志西域出有
葱頭生葱名有青葱鹿葱今葱薤薤之有山葱砂葱明

葱梗葱蒜葱其種不一本性味莫二牛乳可食藥性溫
蔬也禮記云爲君子擇葱 絕其本末單六味五種外

直中空有葱通之象食經云菜伯又名和事草諸物皆宜
之義

植蔥葱子黑色三瓣狀有皺紋收取陰乾泰治上調陸種
之去草頻澆待苗高四五寸鋤溝栽之宜晒焉去壳鬚
疏行秘排鵝豕糞和粗糠壅之不拘時霍時云三月別
小葱六月別大葱冬葱暑種則茂種宜甲子甲申巳卯
辛未辛巳辛卯忌西風九焦

本性味辛氣溫通竅理絡表邪散寒忌與蜜同食殺人合
藥食病瘡合犬肉雉肉食病血服地黃常山者忌食正

月多食令人生游風冬食令人易病四月每晨空必服
葱白酒調氣血冬至日收葱莖汁以蒲蘆埋入庭中至
夏至日開發盡化爲水以清金玉各三分自消暴熱若
渴可休糧久服成仙名金液漿

交方時疾頭疼發熱連鬚葱白二十莖和米煮粥少許醋
熱食取汗卽解凡傷寒初起二三日者用此 金瘡葱
白連葉炒搗爛敷冷卽易縱血出淋漓卽血止痛住翌
日見水無痕 胎動下血病痛捨心葱白煎濃汁飲之
末者卽安已死卽出未效再服一方加川芎用銀器稷
米煮粥食 中惡死或先病平居寢臥奄然而死者中
惡也急以葱 刺入鼻中男左女右六寸鼻口血出

即刺耳中鼻出血即生如無血出難救此扁鵲秘

方

興

漢書龔遂為勃海守令民畜彘五鵠五榆百本其三
詩維五十叢葱一睡化頭民賣刀買贖三年富庶
詩維五十叢葱一睡化頭民賣刀買贖三年富庶
見我冠童子告曰爾乃文章典吏下謫為唐詩宗雲
詔已降可于豆羹下取甫果得一石上有金字云詩
于本在諫方固今夜捫之靈篆熟聲振扶桑亭夫福
後因佩入歸而飛火入室有南史呂僧珍出
汝文而不貴甫自此後詩思衰退
身甚微以暇悠為業逮貴兄子求官
珍曰汝等自有常分但當速歸葱肆

火葱

火葱圖經云葉青莖白衣赤外直中空似大蒜而小秋種
冬栽茹食細美無辛薰氣故茹素者食之四月收根皮赤
肉白如薑可醃可醋名火葱者根如小炆烟薰植而方茂

食經云芝蔬取其味美也南人呼爲紫微臨冬茂也

植莖種宜停火烟所秋中治畦植相離五六寸一灰糞土

掩之苗出鋤去草以糞水頻澆茂至初夏收根

本性味辛氣溫表邪除寒和中快氣

効力傷風鼻塞取葱塞竅中卽已

葱唐書西域山蔥嶺悉生葱李嗣業討勃律
通鑑蔥嶺見其異移于中國以爲珍蔬

韭

韭圖經云長苗青翠細葉若麥冬狀韭一名韭白葉名韭青
秋開白花成叢子小黑而紋扁可入藥育春黃芽散美故
諺曰春初早韭爾雅翼云物久則變韭變爲見鄭玄云散
道得利陰變爲陽故葱變爲韭本草爲草鐘孔一名陽起

草得陽氣節生也方士記名嬾菜一種永生禮記步遺本
韭字象葉生土形而久生故謂之韭取音象義食經云葷
蔬也

種韭子熟陰乾留春治畦種美土內子市賣者以銅鎗盛
水於火上微煮須臾便生芽者可種不則乃薑蔥者不
堪用地欲高土欲熟糞欲勻畦欲深二七月可植先將
土掘作穴取盆覆地上從盆外落子取韭性向內生也
不得外長忌向日剪剪過以灰糞蓋之常婢令淨諺云
觸露不摘葵對日不剪韭大抵一歲不過五剪留種者
只不過一二剪耳收子種者第一翻割去之主人勿食
鷄糞尤佳韭至五年根滿蟠蚪不茂至三年則根交加

葉細莖紫宜擇高腴土分栽之忌濕泥掘起韭根去老留嫩剪去鬚稍每直行相離五六寸排栽一節約五六莖許又離空復排栽廣行相去八九寸易于鋤耨苗高三寸便剪裁時宜穴中加以熟糞冬覆馬糞不致寒凍宜正月上巳日去畦內陳藥北人至冬移栽土窖中蓋以馬糞爰卽長芽高可寸許不見風日其葉黃嫩謂之韭黃又有冬中以瓦覆韭叢蓋以馬糞北面豎籬障禦風寒至春去糞掘五長二三寸食之香美

〔本性〕味辛氣溫生則辛可豁痰散血熟則甘能溫中補腎春食香夏食臭多食昏神暗日禁與葱同食合牛肉食生熱滿後十日內食之卽發冬月食動氣醜者酒後忌

食養法書云五月食韭損人韭子甘溫腎固精

効方嬰兒初生以韭汁少許灌之即吐出黃水下惡血永

無諸病肉密蓋過夜者為鬱肉屋漏沾者為漏肉有

毒宜搗韭汁飲之良五日向韭畦面東弗語收蚯蚓

泥遇魚骨硬者以少許擦喉外其骨自消謂之六一泥

雜錄詩解惠太子問同周顒各某何味最佳曰春初早韭夏

未晚嫩臣嗜之以為佳蔬耳。魏書馬均者巧思絕

世世居京師有地園可種韭患無水澆乃作翻車令

兒童轉之而園水自覆更出更入其巧自謂。說苑

鄧有五丈夫俱負缶人井出而灌韭終一日一區未

完鄧拆遇下車教之為機重其後輕其前命曰桔槔

終日溉盡百區焉

生瓜

生瓜圖經云蔓本也較黃瓜而頗粗色綠而黑縱有白紋

界之微凹體光而滑膚實而韌可生食可熟食鼓醬醃菹可久留美于諸瓜故得名曰菜瓜食經云稍瓜至稍則結大故名稍也

種法正月作穴預著糞填實候糞性發過掘鬆種之苗牛去草淨隨地布蔓毋翻藤踏蔓生實壯盛

本性味甘氣寒解煩利水苦者有毒殺人小兒禁食禁與酥酢食

効方酒病子炒研末爲丸服



齊紀韓廣敏弟兄早孤並有孝性家無以營葬瓜牛飲早采晚生遂辦葬事人以孝感致

黃瓜

黃瓜圖經云蔓生葉若本芙蓉五尖而鋸者細刺加鍼芒

種五稜亦生白細刺開黃花花多蔬結瓜者卽隨花出小
時如小栗粒至老變爲黃色故名黃瓜結實青白色實脆
嫩多汁有長數寸遍體生刺有青白色可生可熟可醃菹
祭法春秋皆用瓜廣志云胡瓜敘事志云遼東瀋江之種
爲美

種藝二月下種相離尺許鋤穴著灰糞和勻每穴分點二
四子子生苗揀壯者止留一二株餘悉摘之每晨以清
糞水澆遇旱早晚並澆蔓生作架令透風日勿令葉泥
若蔬花太多不實以鷄骨碎若針插根蔓卽結古云種
宜戊辰又法以盆盛肥土將子入內常晒洒以溫水夜
收停煖處候生甲移栽畦中蓋以草蓬頻澆待苗生四

五葉連土移植相離尺許區土更宜實恐兩澆汚葉萎而難茂候苗活天晴鋤耘不失其苗又法預先將畦剝數遍以土熟爲度加熟糞一層以耙樓平或先將子種以布袋包裹水浸懸煖處或入熟糞堆中五六日芽苗得天晴點畦間掩浮土一指厚每晨以清糞水澆候芽長待上移栽若蔓太茂以竹刀刮根跗間以大麥一粒納中則瓜碩大若鋤根則瓜苦踏蔓則瓜爛翻藤則瓜衰凡種一切瓜皆倣此法

留種初生一二瓜者不佳取三四者留之每本只留一枚老圃云收子取生數葉者謂之本瓜母子並留至極熟時摘下切去兩頭收中間子洗淨畛乾收停竹本器內

勿令泄濕凡藏 切瓜子種 倣此

〔本性〕味甘氣寒解煩止渴小兒勿多食

〔効方〕一切火毒熱毒取老黃瓜一條上開刻一孔去瓢入
芒硝分兩懸陰處待硝透露如霜掃收留用目病以人

乳和點餘病敷之

典故

後漢書施延家貧母老鬻力供養常種瓜自結以行
其志○〔刻仙傳〕服閣來往海邊見二人于祠中傳贈

瓜顧問使擔瓜有數十
頭令瞋目乃土方丈山

絲瓜

絲瓜〔圖經〕云蔓生莖絲有稜而光葉若黃瓜大而無刺深
綠色開黃花花以鹽漬可點茶結實色綠有長短有肥瘠
只可煮食老則瓢絲可滌器子黑而扁廣志云蠻瓜廣雅

云布瓜一名天羅絮因老絲多故名蒺藜三月下種三月移栽宜造架高長若棚使透風見日向陽背陰

木性味甘氣寒行絡活血除熱解毒名醫宗會云行氣血多用絲瓜象人經絡借其氣以引之也

効方痘瘡初出或未出多者可少少者令稀老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性研末沙糖水調服 經脈不通及

變爲枯血者乾絲瓜一個爲末白鴿血調爲餅晒乾復研末每服二錢酒調下或先服四物湯 乳汁不通

以絲瓜連子燒存性爲末酒服三錢覆被取汗 腦

疼絲瓜藤近根三五尺燒存性每服一錢酒下又鼻中常流臭黃水名控腦沙有虫食腦或用之以愈 骨

便者七月七日取絲瓜根燒存性為末溫酒服神效

冬瓜 晉書桑虞國種瓜初熟時有人跡墮地之虞以為因垣

多荆棘悲致傷乃使食之開端及餘瓜將出見通
通利方送所瓜墮墮口方落云年飢有人得或花布
瓜煮食從此陽萎無復人事始云古人以多食為病今
之病君子假道學者以絲瓜為未人結凡下而切
食之裝陽難效以欺人自云直心不動有酒養回守

夫

冬瓜

冬瓜國經云莖粗如指有毛中出蕊朱大而青開白花實生
蔓者若枕圓者若斗皮厚有毛初生青綠及老則青
皮上白如塗粉兩瓢子咸白故曰白瓜廣雅云水芝一名
瓠莖冬可食故名冬一二云始產東海曰東瓜

植於瓜須傍陰地作區圍二尺忌休五寸以糞和土熟正

月晦日種又十月種區維雪區土潤澤肥美勝于春種
八月斷其稍揀實小者摘去止留大者數枚經雪乃熟
藏宜高燥處禁鹽醋及簫歸雞犬觸犯所宜與犬子同
安置可經年不壞瓜蒂灣曲及貼肉者雌瓜也候極老
勿沍濕留作種

木性味甘氣寒益氣除滿行水消煩有熱病者宜食冷虛
及患寒疾久病者忌之霜降後方可食不然反生病九
月勿食老人小兒禁之

効方明日悅顏延年難老冬瓜仁七升絹袋盛投三沸湯
須臾取出晒乾若此者三度並酒浸一宿晒乾後未日
服方寸澤而悅容白瓜仁玉兩桃花四兩其偽壯食

瓜仁欲紅加桃花皮三十

唐書明皇間李自曰我朝出典太后發愈自對曰太宗
之朝敗出多門在人之道如小兒市瓜誰拔肥大者
我朝在人如淘沙取金耳○三十國記涼天水守史
倭暴死五日而興云見涼光殿無一物皆生白瓜累累
累及秦史應誠
源小芋白瓜

源小阜自瓜

南瓜

南瓜圖經云蔓生莖粗空葉大如銅草葉而澁綠有毛圓黃葉作筒可采食結實橫圓而堅扁亦有柄如葫蘆亦有真如枕膚起凹紋白色界之嫩者老黃熟者如蜜色子扁曲微白可煮食荒年救饑可飼豕可喂猪南人呼南瓜北人呼北瓜一名蜜瓜名其味也

種熟土掘起作穴如種西瓜法三月下種成苗移栽相
去六七尺一穴每穴只可點于一二粒相去五六寸許
苗生糞水頻澆結實不宜場土以磚石欄之則味甘美
不則味淡或瓢中生蛆

性味甘氣冷養脾寬膈多食令人病瘧同羊肉食之雍
氣

北方皮浮虛虛以皮燒存性為末酒調服

瓜

後魏書楊情典選多以言貌取人時尚書典選似貧

人買瓜

惟取大者

○集異傳云

一婦性至孝

家甚貧

夫出死

婦養姑甚

時年遭

喪其可

貨者易米

以養姑亦不

嘗糖質亦繁

中有二瓜

其性甚熱

懷歸則

乏丙子盡暴

黃金時人

以為孝思

所發號其

名曰金瓜

苦瓜

昔人蔓生莖青有稜葉若葡萄形開小黃花結實有三稜
圓而體疣瘡瘻痕如蟹莖狀嫩燥老膩若老極瓜裂分橫
瓢變紅色遠望之若花然其子形若蟹狀而爲小其瓜生
食解熱伏中和肉煮可經日且遠蠲瘡名苦蕒枝方士
志藥蕒瓜牙譜班帶荷乃蔬中謀及也考古未人蔬中以
爲珍貴物耳

植藝春初治陸生秧秧開大葉移栽先挖穴尺餘深填以
草糞掩以肥土方栽之頻澆糞水宜壅烟塵則蔓茂每
穴止留一科或竹木作架棚引蔓須培去傍枝生存正
本待八九尺存其蔓延結實壯大

性味苦氣寒解熱消暑清血疏氣有冷病者禁食

效方眼熱瘡癰藥煮水頻洗藥治熱癰且妙

瓜

男錄姓翁仲善種瓜萊灌園以供衣食人或餽之無以爲其廉賤如此○道學傳祿以通廣人其爲市人求取以知其味

瓜

瓠園經云扁蒲就地蔓生苗葉花俱如葫蘆但色微淡結實長一二尺嫩可煮食有相如人則有大過兩園兩頭相似內藏白剗剗發晒乾爲蔬老則不堪食

植熟春初熟上治穴相離五六尺許入糞拌土合勻二月土旬以予二三粒點于穴內頻澆苗生間大槩去弱留強一二株鋤其傍土勿動根類以糞水澆若生蟻以羊骨引之

本性味甘淡氣寒除煩解熱壓金石壽患冷氣者忌食
兩者有毒食之令人吐可入藥療浮腫

効方年久爛瘡用壳燒存性油調敷之

瓜 瓜梁人勤而澤瓜茂楚人龜而稀灌其瓜楚令以梁
瓜美而楚強夜竊種之而瓜有焦者梁亭請劇欲報
楚種瓜宋就口是滿湖令人夜灌楚瓜楚亭旦而往
瓜已灌察之則梁亭為也楚令大悅以聞楚王王曰
梁之陰讓也謝以重幣而交于梁王

葫蘆

葫蘆圖經云蔓本也莖軟有絲如朋藥園有小白毛面青
皆曰開白花實小時有白毛漸長漸退有甜有苦有斑白
兩色墀雅云藤頂短大腹曰匏細而合上曰瓠似瓠而肥
圓曰壺可削條作臍可蜜煎作果可素可量及老小者作

盆蓋長柄者作噴壺亞腰者盛藥餌冬盛酒不寒夏盛酒不溫匏之爲物驟然而生用之無窮舉無棄材

植莖廣莖者與瓠同法若作匏者臘月晦日種之有佳但不宜鋤根一法正月內掘地作坑數尺填以腐草敗葉一層如此數層可以麻餅棉枯一層向上一層以肥土填尺餘坑方四五尺每坑只下子十餘粒待苗長尺許揀肥好者四莖每兩莖相縛一處仍以竹刀刮去半邊以物壓住以牛糞黃泥封之如接樹法裹待生做處只留一頭取此兩莖亦如前法四莖合作一莖長大只留一莖結葫蘆只揀正大者留一二顆餘俱去之依此法實極大長頸者如前法治如欲將長頸打結待葫蘆

豆蠹時將根下土撈去一邊却剪開根頭極大
者一粒在根裏仍將土掩根俟二三日通根蘆葉俱
黃欲死任意將葫蘆結成絲環等式仍取自根中已
豆照舊培澆數日後鮮如嫩候老收

本性味甘氣涼利水寬定消渴甘者無毒苦者有毒不
食惟佩以渡水治蠱毒功奇

刻方眼目昏瞶七月七日收蠶白瓢絞汁一合醋一升
舌錢七文微火煎減每日取抹背一水瀉者苦葫蘆瓢
捻如豆粒以麩裹煮一宿空心服七粒至午常出水一
斗二日水自出不止大瘦乃瘥三年內忌鹹物此聖惠
方也

長生之道翁曰予可人堂中我教子翁人招長房隨
而人之其中則是大地人間之景象
一符能補地伏瘡時災推顯人間

豇豆


豇豆圖經云豇本也谷之屬也葉木大者如赤小豆葉
開花白紅兩色若蝴蝶狀莢有白青紫斑駁數棟兩兩並
垂短者七八寸長者尺餘大者若小指小者如筋子如腎
形有紅黑白之異一種苗矮者狀如小豆莢不堪藏收子
為粥其美矣晉之地多植之以助食用廣志云豇豆者義
取並生也

種豇穀兩前後下種六月可食收種便時八月可食莢長
可造架引之不喜肥土宜灰壅一種收實者常與小豆同

本性味甘氣溫神腎健脾生精益髓但病滿者忌食之

宜食

劫方中肩瘁毒者飲豇豆湯即解

 飛小獨之不能脫而受死長嘆曰吾生亦如是耳
藏于足樹冠而去

豇豆

補豆綱經云蔓本發枝對生一枝三葉本固木尖開紅白
花狀如小蝶莢隨花出有白青紫數色莢長二三寸生葉
下名葉下藏有種莢泡者形如龍爪蠶蠶半餘莢成穗自
露後更繁衍嫩則煮食老則收子亦可者食子有赤黑斑
點者不可大藥方土記云沿籬豆食物云蠶皆豇豆其形

也餘秋豆言其時也乃菽屬荳種前菹豆化開其年多水
農人以爲徵驗

菹菹仲春下種籬邊苗生去浸或作棚架引蔓宜壅以灰
糞

本性味甘氣溫和中理氣去濕清暑解酒毒河豚魚毒一
切草木毒一康夫教人者豆求浸長大鹽食之有益
初方毒藥墮胎及服毒藥傷娠者日扁豆去皮生研米
飲下若胎氣已傷未墮者或口禁目汗手強頭低似乎
中風九死一生者服之又不識作風治以死無疑
痢用白扁豆炒黃水浸洗淨勿洗以滾湯燻過和猪骨
脂肉一條葱一握煮爛食之
豆汁鹽醋拌勻以燻豆花

作餽飽燕熟食

荀子云公子重耳遊國中見蜘蛛布網于豆架曳蠅
執采而食之曰此止有智其德薄矣而猶以智盡其
給也其蠅執采而食之況乎人之智不能靡盡天之
給也羅地之網以供方丈之御是不若一虫之智也

時季豆

時季豆乃菽屬也葉似菜豆而色淡嫩可茹食花白如粉
蝶狀結角長二三寸如蛾眉豆而小肌膚滑潤自根至稍
繁衍生角其色淡碧子鮮紅色亦有白者每角中或三五
粒早于諸豆可種雨季故各二季豆又名碧豆云其色也
有種秋官者臨秋方茂

種豆二月下種五月采收熟子復種七月采有種晚者三
月下種也肥潤土不宜深穴厚蓋苗生頻澆插竹木引

蔓秋結實與菹豆同

本性味甘氣溫調榮養胃補氣和血予色形若腎可益真火助元陽本草畧而亡正孔子嘆史無真文

効方思慮過度心腎不交虛火炎上者和粳米煮粥食之甚佳



一婦人六月摘豆角有蛸虫垂絲着衣其夫怪之問于余曰乾雀噪而佳客至喜山集而婦孕男合子淳

道必至也果然

茄

茄圖經云葉若蜀葵梗生芒刺蒂亦有刺花無謠開紫色失嫩黃藥亦有白者結實有紫青白三色形有如罌狀如鐘柄如茄包有圓如卵有長至大餘老則變金色子若蓼

子而黃可煮食可鹽留廣志云落酥食經云昆侖瓜一云小菰來白進羅者名彭亨又名海渤南滇外產綱茄非其類姚向云嶺南茄一植數載成樹用梯摘實老而實小伐之另植

植茄春擇土作畦下種溫水澆之苗生兩三葉帶原土移擇獨根強壯者相離二三寸一苗勻栽常澆糞水至六七寸高先治成畦畦中作穴相去尺餘移苗帶本上栽之類澆此物喜肥愛潤結實鮮美諺云茄栽開花每科以硫黃着根下則結實佳美忌牝豕遊下則不實法以箕撈之則復結須知摘葉棄路間今行人踐踏令實繁各方氣土不同總之百日成功又法正月預以糞和

灰土實填作一坑候土發過熱篩以盆盛土種諸子常
 酒水日晡夜收煖處候生用時分種肥畦常以清肥水
 澆之上用低棚蓋之苗深帶本上移植

本性味甘氣寒朱丹溪謂茄屬土甘而降火熟食厚腸胃
 北人食之無害南人不敢常食產婦不宜病氣人禁食
 秋後茄發目疾

効方灰痢不止茄根燒灰石榴皮燒灰等分爲末沙饑
 水服 趾腫不能行走九月收茄根懸簷下逐日煎

湯洗之



水經石頭對西蔡浦長白里有茄子蒲○習習承序

爲勤陽合有園圖茄初熟時人盜而爲雨進食其
 熟摘其大小並帶子遂服伏罪○高僧傳一園僧種

長老舒步於園所觀其藝圃俗間曰禪行以參乎
明在草頭即將易子參可得祖師意出此
示以茄子泰今啗捧豎拈拈拈皆悟

藤安

藤安圖經云莖青而葉柔細有岐開細花成簇如芹淡紫
色四五月子熟如麻子狀亦辛香子葉俱可用生熟堪作
食說又在按其葉柔細而根多鬚綫綫然故謂之菱始自
張騫得種于西域故名胡菱因石勒名胡改作香菱今謂
藤菱者即莖葉葉散之貌

極執種宜明日晚撒子頻以清糞水澆則易茂六七月種
者可冬良有春時沃水生芽者其苗小炕鬱蒸生者其
色蒼黃

本性味辛氣溫辟魚腥逐飛尸鬼注毒蠱毒利諸菜今人口
 爽久食耗人精神多忘華陀云腋氣口臭匿齒足氣金
 瘡者禁食其根損陽滑精發痼疾同斜蒿食令人汗臭
 又難產服藥有白朮牡丹者忌食

効方痘疹不快以蘆薈煎湯微微含噴項背至足勿喫頭
 面又掛田于房中以禦一切穢惡 產後無乳以蘆

薈煎湯飲 生黑子日以煎薈湯洗



詩話

有土京其妻采菜而吟曰可憐春時節依前

情無端隱恨念采菜留心問吟罷一美少年踰
 牆笑曰何吟之苦卯愁緒千端豈知且吟頃刻之
 少年曲為調弄氏父吟云誰家少年兒心中暗藏其
 得意意頃刻事猶恐有問則少年問吟答云張碩
 女文君遇長卿逢時雨出得卿足慰冬情忽瞻身而

去聞無所見
 猶若斐然

藥名公鑑 百病根深冬生苗作叢即生綠葉線縐若宿節
特生於五六月開黃花若蛇床子而色黃子如麥粒輕而
細五月莖葉可祛蠅辟穢腐肉得之止惡臭氣露得之
可回味故有茴香之名本草云穢有種時藟形似茴子其
味左矣

種藟宜向陽地以糞土和子種當年苗長收子至十月所
其枝以糞蓋根來年更茂七八月取子晒乾

本性味辛氣平理氣開胃煖元補腎可入食料多食損耳
効也腎虛氣冷力弱者以茴香六兩作三分生附子一個
去皮作二分第二度將一分妙黃留一宿出火毒去附

子留茴香爲末每服一錢空心鹽酒下第二度將二分炒黃出火毒存附子一半同茴香爲末如前服之第三度將三分炒黃出火毒全研爲末如前服之



洞冥記金日碑入侍自台香以薰衣服帝見悅之宮人效以憎其媚○齊書王敬則微時戲遊園中荷下有虫如弟豆者集其身摘去皆泣血哭則惡之卜于道者曰此封侯之瑞也後里賜

山藥

山藥圖經云春深苗生莖紫葉青三尖厚而光澤蔓延之餘立夏後開細花成穗淡紅大類棗花秋生實名薯蓣秋熟落根下狀如雷九皮色土黃而肉白者煮食其而滑美冬掘根扁者各佛掌薯蓣者各牛尾薯一科有重至七八斤者皮黃肉白肌薄有毛仙書黑者不堪用神農

本經爲薯蕷方士記名士譜一名兄草廣志云玉液食物云修脆山海經云景山此聖少澤其草冬諸避唐代宗諱改爲薯又避宋英宗諱改爲山藥

惟薯蕷間以地掘二三尺深許以腐草敗葉填半土着糞土着社前後取宿根多毛有白癰者竹刀截成二三寸長塊豎植穴八土仍以糞土覆與穴平旱澆由生或以竹木作援高四五尺旱宜頻澆法宜每年易人而植薯牛糞麻_山但惡人泄猪糞

修製須以布裹手刮去皮以水浸溼少人白礬若未經宿洗淨則澁自去如欲晒乾盛置簾筵透風處不得見日至少乾五分候全乾收貯或入籠微火烘或熬過後晒易

乾可入藥

本性味甘氣溫理脾補腎諸虛有虛有虛有性溫者食勝根補益

効方虛弱者用山藥研末入饅頭若滑旋旋添令香攪

勻之空心服



廣記蘭陵縣靜之園地得一諸肥澤而紅烹食之効少力強遇道者顯曰于神氣如是必服用餌植其肌日所食者肉靈芝非斯也青等龜鏡三輔錄張中附隱身不仕所居建甌人食山蔬土諸坂形骸于雲水之間無闕榮未

芹

芹圖經云春仲生苗葉對離生似薺而華有節稜百中空氣芳芬潤細白花白芹取根赤芹葉俱堪作羹考芹古

作蔬一名苦蕒食物云楚葵生于水澤者爲水英呂覽云
味之美者雲夢之芹雲夢有蘄州蘄縣爾雅疏云此地多
芹故字從芹詩云思樂泮水薄采其芹

植藝作畦種子田生移栽濕澤地頗澆水五六月開花結

子落土卽生

本性味甘氣涼養血調氣和醋食但多食損齒三八月忌
食生芹恐虺蜴遺精于葉誤食則面手青紫腹痛須服
硬錫二三升吐出惡物瘥

効方獐犬傷用水芹根搗汁和香油服日三七日止

藥錄 音稽書夜云野人有當芹之水而美子飲飲之
三草雖有區區之幸亦已疎矣

薺

薺者野蔬也有沙薺大薺梗有毛者各莠莫味欠佳雖是
野蔬喜生園中不勞人工可以助穀古人爲蚕生不薺菜
食以薺蚕故以薺名又名苦草師曠謂苦草先生卽此也
本性味甘氣平和肝養血食能明目凡人夜則血歸于肝
肝乃宿血之臟三更不睡則朝旦而面黃神荒因血不
能歸故也若肝氣和血脈通則魂自安而目明矣攻功
業者必于三更時瞑目少睡令氣血好和不推之病沉
者至三更難眠而明日更據

効方花鋪席下遠虫蝶及蚊蠶月令云晴明日未出時米
薺莖陰乾夏作燈杖則蚊蠶不敢近

薺

東坡集薺味極美天然之珍而生味外之君則臣所
八珍皆可歌也天生此物亦爲自人陶居之福不可

忽也

蕨

厥山疏也爾雅名鼈詩云漚彼南山言采其蕨時雲云可似祭祀周禮采之三日出芽奉曲長則展葉如鳳尾嫩莖無葉采收以灰湯煮去涎漚出晒乾作蔬可葷可素根可漚粉可漚可蒸可救饑牛此根之大有益

製粉根紫者掘出洗淨搗碎入清水桶內淘揉粉莖去查以細布漉出小滓令澄瀉黃水再入清水令澄待白凡易澄滲水留粉取粉鋪箔上晒乾色黃名曰蕨粉

本性味甘氣寒滑去暴熱利小使令人能睡

効方虫虵蟪傷蕨根燒存性香油調敷



本畫武王戊紂伯勇叔齊義恥食周粟采薇于百陽
 山歌曰登彼西山八氣其法矣以暴易暴兮不知其
 非矣○齊書齊土東坡張翰謂西子曰天下紛紛未
 已我本山林無望于州公山易通山羹飲明旨孟廣

三農紀卷之五

古蜀

張宗法師古甫

小引

一太極生生而化萬太極萬太極成成而歸一太極
自然而然乃和氣所發性無不善一物有一身一身
一乾坤受其正者美失其正者不美

王古之民以果蓏養腸胃神農出天雨穀黃帝分甘醴后
稷治其藝周禮職方氏辨五土之物甸師掌野果蓏場人
樹果蓏珍異之物歲時之觀素問以五果爲五助五色五
味應五臟禮記內則列果品之數古書云欲知五穀之敗
否但卜五果之盛衰然果蓏田佐五穀熟可以食乾可以

肺豐歉可以濟時疾苦可以備藥輔助養生之物也

種實

地不厭高肥上爲上鋤不厭數上鬆爲良須各按時節下
種種時必將子于日中晒乾于細者宜種淺而上蓋糞須
擇晴明日若遇雨難生三五日得雨良旱宜頻澆桃李之
類須擇味美實大者作種待熟至望前卜向陽軟處寬掘
穴尺餘用糞和土填平取核向土排定加糞土蓋之至春
芽生候成小樹帶原土移栽

栽蔬

栽時以大蒜一枚甘藷一寸或百部末一撮先置根下永
虫患根間少填鍾乳石結實甘美栽宜切去前根而多實

望後則實少若樹根無宿土者宜鋤穴以清泥土和土或
泥將樹栽泥中輕提起樹根與地平則根舒伸而不空虛
栽後三五日方用水澆勿太乾乾則根難行勿太濕濕則
根易腐勿露孔竅則風易入四圍宜木架縛穩禁勿動搖
無不生活栽後以荆棘圍樹四邊則人畜不能損氣暖而
又可避寒暑春分和氣時栽不得夏至陰氣既盛種不
得但壓枝必在秋分後栽必在春分惟鑿根不拘時節耳
栽宜中材樹今年鋤根半邊現根留半根半邊在土鋤開
者掩土至來年雨水節或吐米芽時令掘移栽澆水以杵
築實忌足踏

扞枝

三月上旬取直美嫩杈如杼指大長三尺或扞大芋或蘿
荷蕪蒿中種之三年成樹全勝種核者凡插樹先以熟土
劇熟成畦以水浸之正月間木芽將動揀肥壯枝餘挿入
者斷長尺餘每條下削成馬耳狀又先以小杖插刺成孔
深欲與條過半然後以條推入以土壓實每穴相去尺許
常澆令潤搭棚蔽日至冬換作暖陰次年去之候長成高
條移栽惟插枝者若遇天陰過雨活多

壓枝

春開屈樹枝就地用木勾攀定身半斷以土覆枝露稍以
肥水澆灌至梅雨時枝葉仍茂根鬚方生壓時初枝附相
連處斷其半用土厚封次年新葉將萌刀斷連處霜降後

移植

脫枝

揀佳果于秋分中用牛半糞和土包其木之鏤勝處如盃大上裹以楮苧片密縛定重則杖撐柱之常用承澆任其發花結果于來年夏間發一包視生根者梅雨中斷其本埋土中花實晏然不動一年後上中生根仍截去近根者二三尺許遂爲完木又法以罐去底或以竹筒劈破將美樹嫩枝投令其中出稍尺餘許將枝下斫半留半邊納土于中合縛竹筒筒土枝之衛以草束今年治來年春分以刀斷其枝連筒栽之澆無不生茂

接樹

凡果以接博爲妙取速肖之義枝必擇其美條向陽者不
宜背陰枝條接必難成須知各從其類如梅接杏桃接李
櫟接栗赤梨棠梨接質荆桑接魯棗是也若形象不似花
實不時者難云其活接必以細齒鋸一連厚背小刀利刃
一把須得心靈手穩又要任機乘時宜春分前後十日爲
上或取襯青條爲期然必風和時晴方可以接蓋欲得陽
和之氣也一經接博一氣交通以惡易美其法有六一曰
身接貼大宜高接先鋸截去元樹枝莖作盤碗高及肩以
刀際其盤之兩傍微啟小罅深一寸先以竹籤探其罅之
淺深却以所接條約寸許十顯削作小筍形先喻口中假
精液以助其氣禁食醃酒則難活罅中要快捷緊密須明

兩相封插訖以樹皮封纏內寬外緊用牛糞和泥斟酌封
裹仍用寬簍盛土培養接頭勿令透風曰日土乾則澆以
水芽生非接者之芽盡去之培土上露接頭二三孔以通
其和氣若逢天陰則易生二曰根接則小宜近地鋤斷元
樹身去五寸許以所取條削鉤形插入如身接法培以上
以荆棘護之三日皮接用小刀于元樹身人字斜剝之以
小竹籤測其淺深以所接枝條皮肉相內插之封護如前
法候枝條發生去其元樹枝莖四曰枝接若皮接之法而
差返五日層接小樹爲宜先于元樹橫枝上截去留一尺
許于所接條樹上取外方半寸刀尖割皮肉至骨併揭皮
肉須帶芽心生意處揭下口噙少時取出印濕痕于橫枝

上以刀大依痕刻斷元樹壓處大小如一以接之上下兩頭以桑搆皮封繫緊慢得所仍用以年糞泥塗護隨樹大小酌量接之六曰搭接將已種出芽條去地三尺許主稍削併馬耳將所接條併削馬耳相搭接以人唾貼連封繫壅如前法黃山谷云雍也本犁子仲由元鄆人宗法云古人因蟻蛉而有接博因接擡而有驥駟是以胎不姐核不生

過貼

凡遇樹之壓條接換俱不能者乃用過貼法即寄枝也先移性相近葉相固花實相似之小樹植其傍可以枝相交合處以刀各割其皮與膜對合以麻皮縛固泥封嚴密

日久相生去其元枝

澆樹

樹初生芽時則下生根此時不宜澆糞水候嫩條生或
頭花時只宜澆清糞水花大開時又不宜澆倘遇天旱
澆以清水若結實時澆以糞水實卽落實大無妨大約
果忌濃糞須用停久冷糞和清水澆之新糞只宜臘月亦
必和水三之一用肥宜審時正月須水與糞等二三月水
生嫩芽下生新根若澆則傷根未發萌者不妨五月雨水
時澆根必爛六七月發生可輕澆八月忌之曰露雨至必
生嫩根見糞必傷能依月令澆其樹茂正月鋤樹下土以
通陽氣二月鋤樹下草三月須離樹五步作畦溝以利水

早則澆之水則瀉之

茸樹

凡小樹嫩弱不耐寒者宜于臨冬時以綿軟柔草將身包裹以麻皮縛定泥封加以疎秕護其根免凍損

衛果

凡果樹于元旦日未出時用朱旛一幅畫日月七星圖像每逢風起懸園內東牆下卽逢大風園中花實無損諸果樹花盛放時一遭霜卽無實凡逢三尤內有雨人春百日內必有霜預先于園中多積剋草敗葉遇天雨初晴非風寒必此夜有濃霜須焚草葉于上風頭使烟氣觸花果令霜氣不得爲害

治果蠹

凡果樹蠹虫宜着意看之用鐵線作鉤以去之又以雄黃
硫黃作烟薰之王栢農書云用桐油紙然烟塞之于虫未
出時凡敗藥腐枝皆虫蛆窩宜盡去之果樹下常鋤令
草淨若有草則引虫蠹亦分土氣樹下切勿有坑坎恐雨
後漬根朽藥黃宜令平滿比也距高三五寸爲妙人髮懸
樹上鳥獸不敢偷食也遠距地元旦子時將草一把縛樹
上則遠虫清明三鼓以草縛樹不生蠹至虫二月以核木
針塞樹上虫穴或以百部末填穴或樹間有虫竅蛀穴以
硫黃末或堯花末塗之有蠹以清油引之或以羊骨引之
可除其患

孕果

元旦及端午日以斧維斫諸果樹及法以春社日以杵椿諸果樹根下則實繁不落果不實者亦用此法凡果有不結實者可鑿本木方寸許以他木結實汞如鑿力寸許以填之則結實元旦及端午日鷄犬鳴時以火炤諸果木樹下則當年結實繁盛且無虫害

轉樹

凡樹老不結實以石鐘針爲未揭橫間皮大肌外封膚則來歲結如初

制果

木未吐芽時將根傍澤見掘出將鑽心定根去惟存四

邊亂根以土壅 不實則結實肥美

辟瘴果

初開花時惡瘴氣薰觸則實損落宜于園中種蒜韭葱實辟之若有所觸須于上風頭以硫黃燒烟盡解

息果

凡果今年結實來年必歇枝如果樹十株正開花時止留五株餘花悉摘去至來年又摘其今年結實者年年易換則木不傷而常得果

摘果

樹初結果護至熟時以兩手并摘則歲歲結實美盛或令小兒女子采之大忌孝服孕婦僧尼竊摘永難求茂若被

三見錄
人盜食多召禽鼠相害

木性

凡木產此者耐寒產南者喜暖產高山者愛燥產界澤者愛濕早苗者發于陽煦之時晚華者暢于寒涼之候北移南而盛南遷北則變如橘踰淮爲枳昔種南則無根荔枝之屬盛于南方棗柿之類蕃于北上楊李桃杏當春夏之際卽登庭棗柿與橙候秋冬之候方殂豆此物性故然天九不可以強致

果名

梅杏之屬爲核果梨柰之屬爲膚果榛栗胡桃之屬爲壳果松柏之屬爲櫟果棘實爲棗柿實爲橡桑實爲楮栲實

爲任

果徵

諸果不實爲荒桃李多實來歲必穰又老農云獐糲爲
狗糲衰

果害

果忽生有異常者根下必有芽虫屈穴食之殺人凡花六
出者必雙仁有辨果落地有惡虫緣過者食之病心漏凡
果未成核者食之發疔及患寒熱

果異

山海經南荒有三尺之梨北荒有七尺之棗棗荒有三尺
之樛木蘭皮國有五尺之瓜燕門答刺之瓜茄一植五歲

信州之荷四時作花屯羅山之麻實如蓮苗暹羅之稻粒盈寸高番之荔枝可以扶老容梧之桑葉作棟梁維佩云粵中氣候多煥四時常花殘臘花已發盡而桃李蘭桂之屬悉紛然盛放

課果

木奴子無四年自長自生不藉衣食不憂水旱能廣植多種不爲無雨歲歉年之患亦且有久遠之利

桃

枕園經云枝幹扶疎葉狹而長二月開花有紅白深淺單瓣于藥之變爛熳芳菲其態堪嬌木少花盛多繁實甘不其耐老有金絳銀緗曰烏以其色名者也有早秋霜雪以

其時名者也有胭脂絡 絲月月奪駕美八巨方餅以其
名者也有樹矮花繁實 人色紅名壽星可以玩當運斗樞
云玉璣之精化為桃乃 西方之木五木之精始生太行山
谷典術云桃之精生鵲 故取之以壓邪桃乃易生之物
花早而實繁故字從木兆 十億日光言其多也

植執擇向陽地爲穴納 芽生帶上移栽能移 數次實天味甘種術云將核刷
洗淨令女子盛粧種 他日花美味作種書云桃接桃
成金桃李接桃成蜜 梅接桃成脆桃諺云白髮種桃
言桃三季四梅十二年 雖年已老其利可得老農云種
桃淺則易生深則難生 故桃根淺不耐久而易枯須于

初結時斫其樹復生又斫再三若樹生出卽斫令復生
則其根深而盤固至年久花實如初桃長三年花實五
年便衰結實細小十年輒枯爲其花繁實多本少泄甚
而皮緊故也于四年後用刀自樹根剗其皮布至稍
處令膠出可活數年須伐之使另生新條又法先種一
行稀留空所待于三年空中另種一行如此伐老生新
新茂伐老

御桃實太盛則多墜宜以刀斫其枝幹數下乃止註曰規
曰根土持石壓枝則實不墜若生虫以猪首汁眼治之
若生虻者名牙虫須得
年燈檠燈檠其虫自落

三癭桃實盛至虛小麥形

李時曰脾氣溫除患崇益顏色肺病者宜之多食生執
食寒熱者病癥瘕令後入浴成淋及病寒熱與鬱同
食患心痛服木丹石者禁之花能下三尸仁可化瘀血
雙仁有毒桃泉乃自枯枝上之實臨冬不落者能殺鬼
効方大清方術云三月三日收桃花陰乾末至七月七日取烏

家塾云三月三日收桃花陰乾末至七月七日取烏
雞冠血塗面可望潔方士書云三月三日收桃菜挽

取汁七升醋一升向前至六七分服之下諸虫抱朴

子云桃膠以桑灰汁漬過服之可愈百病久服遍體生
光絕穀與術云東同桃枝于五月五日正午時而東

斫成二寸木人着衣帶能補心虛健忘耳目聰明又

云戊子日取東引者三

枕之並川尤妙

莊子云插桃于土連

此觀之桃性畏鬼辟

二人茶與毳律度索

此觀之木之風俗謂上古有弟曰

縛以羣索執以食虎

今歲畫桃符懸門上刻仙傳張

陵與諸弟子登雲臺

弟子無敢觀者惟趙升從上自

漢桃樹得桃實滿懷

而歸凌大奇之二夢子春叔公

孫接田開疆古治子

事景公剪而無禮晏子言王公

貴之三桃且三子受

功而食公孫接田開江拔桃而

赴古治子又言其功

二子反桃執而自殺占治子曰

恥人以誇其志不義

也亦反其桃自解頸而死口贊

子魯哀公賜孔子桃

與索孔子先飯黍而後食桃公

曰以黍雪桃耳對曰

泰乃穀也乃果敢以貴雪時口

漢武故事東郭桃三

人帝呼東方朔至短人指朔

謂上曰王母種桃三

于歲一實此兒不良已後之矣

口稱子昔稱子賤有

龍于衛君遊于果園食之而口

以其半啖君君曰愛

哉忘其口面笑寡人及提子或

色衰愛弛得罪于君

曰是固嘗啖我以飯桃口說苑

當若欲入素客有

東口口溫溫水上見上偶三方

本梗人語本梗謂

上偶曰今大雨至子必沮故事

口我沙乃反吾真耳今子東園之桃也刻
子以爲梗小涼王必浮子之說不知其所以

李

李樹經云枝幹如桃而黑葉亦如桃而綠花小而繁白二
月間放先花後葉而雅翼云李乃木之多子者故字從木
子鹽鐵論云李曰定更補云李直方常第果品以綠李爲
首韋述云李爲嘉慶子者東都之產地名西京記云漢武
初修上林苑造方各獻名果惟李有名朱黃紫綠青綺羌
燕猴及千車下青房合枝之屬其類近百實有大小圓扁
早晚之分味有甘酸苦澁之別色有青綠黃赤紫朱縹綺
胭脂青皮紫灰之殊形有牛心馬肝柰杏冰李離核合核
無核扁鋒之異極可耐久雖經三十年枝枯子亦不細故

素問以李爲東方果也

植藝管子云三才之上宜李種核如桃否法不如植條之
速利耳春取美樹下近根條小者栽之李性寒宜踈須
南北成行率兩步一株太密則聯蔭實不佳樹下草宜
淨不宜耕耕則土肥而無實宜土堅而瘠瘦根下藏以
牛馬畜骨則甘美諸樹皆然以柳屢生子甘紅以木樹
接則實美奇

嫁李元旦日或元夜日以磚石着李枝岐中可令實繁或
夜以火焰之當年結實美盛或十二月中以杖敲樹中
正月晦日復微敲可令子足又法以寒食醋醋火着揉

樹則妙

占應書云李其繁王小豆

本性味甘酸氣溫有小毒乾者去痼疾却骨中勞熱肝肺者宜之生啖生熱發痰服朮人禁食不可合雀肉合蜜合漿水食臨水食沉水者有毒

効方痘出有毒衣丁花桃花杏花梨花其為未勿一錢白湯

下



漢書李廣村軍何如如鄧人日不出辭及死之日天

王戎年七歲與諸兒競走販之推戎不動人問之答曰樹在路旁而子多

競走販之也取之信然○韓詩外傳東方曼倩與反

行道中乞飲不知家者姓名時見博勞鳥飛集李樹

上曼倩曰此十人當姓李名博也呼當應聲中思有

李博者與出田見即取飲之○晉書王戎家有美李

估恐人得連鎖其核成父雁憲所歷九州人懷其德

惠相宰致學數百歲辭不受大能辭數百歲而不受
而乃荆一果之陣此非人情必當時好惡造言之說
耳○晉書何喬性儉家樹好李帝求之不遇數十王
武子因其山率少年將斧諸園飽啖畢伐樹而去人
謂晉風薄尚一味之果且不
詰于君而況非祇之事乎

杏

杏園經云藥似梅微紅差大圓而有尖二月開花未開色
紅開時色微紅至落純白結實生酢熟則品類不一形似
梅者味酸如桃者味甜各有金杏白杏沙杏梅杏奈杏木
杏山杏赤黃栗只金剛杏蓬萊杏始生晉州山谷南人呼為
甜梅象及象丁在木枝之形典術云杏乃東方歲星之精
乃靈木也可為通神風鑑云榆東鳳處今地運昌曰肝

而執管丁云五派之士宜杏擇味美實大熟時帶肉種之

古應占書云本花實多其年豆收大麥熟

氣溫潤肺滋腸雙仁者有毒

未遇戌子日和并花水服之効

小兒臍風杏仁研敷

腹刻

犬傷杏仁嚼敷犬肉不消者前汁服以下爲度

三世紀

卷之五

七

行原以上距陸而止左手據膝右手持頤以聽曲終
召子貢子路不以彼何爲者由曰孔氏曰何治曰服
忠信行仁義釋禮樂選人倫曰有士之君也曰非也
漁父曰亡則不矣終不免其身孔子聞而弗問之遂
言八疵四病以誠口溥陽記董琴居廬山爲人治病
得愈者命植杏五株數年成林今猶稱董先生杏口
後周書張元性廉潔其却有木樹數株枝
枝節果熟落元籬內悉以遺其主

棗

棗園經云木皮黑粗葉細小而深綠背微白發芽畧遲五
月開小淡黃花落卽結實生青漸白至微見紅絲卽堪啖
熟則純紅棗種甚多方輿記南產者堅燥北產者肥美
雅云棗茨屬也大爲棗小爲棘棗性高故重轉性底故並
草木狀云木蜜爾雅云還味言味小美也宋草云百益紅
有益百病也方術云青棘棘木作針豕可驅鬼神五代記

云其木可刊爰字甚于梨桂

植執要術云旱涼之地不任稼穡者執之則任矣棗核性堅芽難生揀味實佳者大樹斫生條一二尺高者後栽相離三步一行初植者本年芽未生勿劇去諺云栽棗三年不算死

棗元旦日未出時以斧背斑駁樵之名曰嫁棗不樵則花不實斫則實繁而落又花大放時以杖擊其枝間振去繁花則結實繁大

開棗棗全赤即收摭而落者爲上半赤而收者肉未充滿乾則色黃而皮皺將赤味亦不佳全赤久不收則皮硬復召鳥鼠耗晒棗治一大塲歐合淨收河砂于內令日

曝熱鋪棗于間以掀聚壘久之復散一日再三夜則合聚待晒乾篩去砂收棗芳譜云死治地令草淨若有草能令棗貝架箔棹上以無齒杷聚而復散散而又聚日以二十度爲什夜逢陰亦不必聚收待霜露氣可速成如有雨須聚而苦蓋至五六日撰其紅軟者至高厨暴之辟爛者去之否則恐爛餘棗其乾者晒曝如法

藏裏方熟時果清晨連小枝葉摘下勿損傷於透風處晾去露氣簡新礮一口無油酒氣清水刷洗淨火薰乾服涼藥清神草晒乾候令一層草一層棗入甕中嚴封可致來年尤鮮

棗食經云治乾熱須鋪箔上晝晒夜露擇去胖爛曝乾

收之切開晒乾者爲棗脯隸笨去渣皮者爲棗實蒸熟者爲膠棗加饴蜜拌蒸則甜加麻油和蒸則潤將紅潤乾棗入釜內以水平煮湯濾出盛磁盆內細研用生布絞取汁塗盤上晒乾其形以油爲棗膏候乾以手摩刮下爲末收停每用一匙投湯盃中卽成美漿合米炒食最宜

古應書云棗盛至來年永豐

本性味甘氣平堅志强力補中益氣熟者過食疾齒生者多啖腹滿中滿齒疾者忌食小兒禁食同荔枝杏仁臟腑不和同魚肉食患腰腹疼痛異錄云白益一損名棗也劉根云棗核中仁常服之百病不干

効方久服身馥洋香棗肉桂心冬瓜仁松白皮煉蜜爲丸
一和臟腑紆聚去核緩火逼熟焙乾爲末量多少入生
薑少許白湯下一典術云咒棗能治瘧須執棗一枚向
日咒云吾有棗一枚一心歸大道優他或優降或劈火
燒之念七遍與患者食之

典故

東方朔傳武帝時上林獻棗上以杖擊未火毀前呼
朔曰此來此來允此箇中何物朔曰上林棗四十九
十土日何以知之曰呼朔者上也以杖擊而墜者兩
未也雨水乃林以大不若棗收北叱者七七四十九
枝也因以知之○晏子曰秋齊景公曰吾聞東南有
棗焉非而不實何也晏子曰昔者魯公常乘龍治天
下以黃布晨人棗至海而投其布墜蒸棗故墜而不
實公曰吾自問晏子對曰聞之洋問者必詳答也○
云仙傳李意其居一士窟內冬夏帶衣但飲水食棗
或三月一出或一年一出後人不知其終○亦因
詭信安縣有懸壺披音府有樵夫主要日子白室中
見童子四人彈瑟而歌童子以人也移與舍之頃童

子令歸質敢斧斤相澤然朽盡既歸去家已數百年矣
訪其舊舊嘗落洛無復識此○高士傳胡昭與晉帝爲
布衣交有同郡周上欲殺帝昭泣以示誡土感乃止
研桑向其土盟而別後見帝終不言○春秋繫路云
據桑與錯金示嬰兒嬰兒必取桑而不取金故物之
下人也小者易知

栗

栗圖經云栗如杼櫟樹亦相似木有大小二種四月開花
長條青黃色農人收花爲繩留火風雨不滅苞生外壳如
蠅其中著實或單或雙或三四粒實壳紫色仁上有紅黃
膜肉外黃內白八九月熟壳開花落故大禮戴云八月栗
霍則苞自裂實墜說文云栗象花實下垂之狀呂氏春秋
云果之美者箕山之栗楚書名爲伽原生山陰五果之中
惟栗屬水水涼之年則不熟漢書云燕秦有千樹栗其人

與于戶侯等其木堅耐入上水可經久作神主益子孫逢
門闌遠盜

植莢要術云栗可種不可栽栽雖活易尋死初熟離包卽
收埋濕土中路遠者合砂以囊盛之久停及風日枯者
難生窖者至二月微吐芽種之卽生旣生近三年內冬
須以芷草裹之至春漸解其裹樹高三五尺取生子樹
接之或以橡樹接亦可實大而佳北方難植南方易生
物也

藏栗衍義云栗欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春
木尚如新栗栗性喜濕子需後取生栗投水中去深者
餘漚出脰乾令將漚沙炒乾候冷取新漚裹入一層栗

一層沙欲九分蒲川箸札定上畧加黃土封之禁酒氣
至來年不壞霜後取沉水栗一斗用鹽一斤調水浸栗
經宿漚起時乾或盛竹籃或裝麻布袋掛背日通風處
日日搖動兩三次至來年不壞蛀

本性味酸氣溫厚 胃益腎 候粒活血生食難消動氣熟食
帶氣濕乾火煨者良小兒多食難消患風痰水疳者忌
食爲味酸故

効方李時珍云風乾者勝 於日曝火煨油炒者勝于蒸煮
細嚼連渣吞咽有益若頓食至飽則陽胃蘇子由詩云
老去自添腰足病山翁服栗舊傳方客來爲說晨與晚
三咽徐收白玉漿 金傷獸咬人嚙小兒并瘡馬汗毒

俱以栗嚼敷

典故

宋書王泰幼穎悟年數歲祖昶嘗呼諸侄散栗于床
 中表咸異之。先賢傳光武召嚴遵請行在遇蜀都
 日召賜臣以禮臣奉
 不敢取也。梁書蕭琛嘗預御筵醉伏上以束投探
 採乃取栗擲上巾而
 有人不謂如此豈有
 敢不報之以戰栗
 所田有日食栗仍
 理三年令抱生栗人
 者養田是于栗用皆
 足栗栗用皆伏服而
 以智龍羣祖也。秦
 應請發五苑粟而
 以教荒

梅

梅圖經云形類杏比葉更
 同其幹枝交加多成女字形

象花而華臘月開白花五瓣花謝生葉果生青熟則若杏
實狀但核異五月實熟收製精乾爲烏梅取汁可入染色
者金銀器去垢又可入藥鹽醃者爲白梅實可糖可醃造
藏以充果餌寄筴汁爲漿餽又云梅者媒也媒合衆味
古人取以調羹理雅云杏入北方爲梅舌文作果乃杏屬
反杏爲梅始生溪中山谷今江南江北無地不勝

種桃核種肥熟上莖生長二尺許移栽移傍條則速利若
移大樹則去枝稍大者盤根沃以溝泥無不活以桃接
則圓脆以杏接則耐久化書云李接桃而本強者其實
毛梅接杏而本強者其實甘山坡不任稼穡者宜收熟
實熟之十二年樹成結實且耐久梅熟時以杖敲落收

實火炕烟薰以乾爲度又以稻草灰淋水潤蒸過則肥
澤若久枯者亦用此法每生果三十斤而乾十造白梅
梅微嫩時摘下服桑鹽醃透碎其核日晒以乾爲度多
能留事梅花半開時清口帶蒂收摘每花一兩妙鹽一
兩納瓶中不可手犯以紙密封至次年取出置蜜于盞
取花兩三朵滾湯一泡香美異常罕矣集折梅花押鹽
中開美態可見物性之相知梅譜云梅有五種綠萼照
水玉蝶紅梅苦練接梅則色黑爲墨梅紅桃接梅則色
亦爲朱砂梅此乃高人韻士玩賞之屬農夫無識其妙
不敢續尾

占應占山言云梅實多其年、所收農諺云樹無梅子手無金

本性味酸氣溫生津歛氣安邪和中多食損齒傷筋相感
志云梅同韶粉食則不酸不軟齒食梅齏者嚼胡桃肉
齏

効方利人肉難出白梅肉日嚼之敷印出又治初疽休息

痢及霍亂烏梅肉建茶乾薑為丸每服三十妙

朱史言直隸居孤山微辟不就構巢居間築梅樹花

吟嘯自適胡洋胡上或連宵不透其居曰梅花生與

交族情官辭不受梅樹數百株各其居曰梅花生與

其弟若助刊詩請昔日吟嘯于其中○說范王晉希

玉明題梅花詩云而今未問謂美事其面百花頭上

開別業正見而美云此生已安挑狀元宰相也○則

州記云陸詠與范曄善自江南奇梅花一枝諸長公

與曄並贈詩云振梅逢驛使奇與嶺頭人江南無所

有獨贈一枝春○芳錄錄賦道人常赤足走雪中與

堯則明誦南華秋水篇嚼梅花滿自和雪咽之香欲

寒香心人財贈常令清快○宋書武帝女壽陽公主

皇后勤之自後有梅花性○東方朔傳別有生徒三人俱遊乃見一鳩一生曰今當有酒一生曰其酒必醖一生曰雖酒不得飲也三生自問其故出門見鳴飲水故知得酒飛集梅樹故知酸酒集樹枝折故知不得飲也

核桃

核桃圖經云樹尚文許春初生葉長一二寸兩兩對生厚而多陰三月開花成穗收焯水浸可蔬結實似梨狀秋末杖下漚去外唐收取肉核上壳堅硬上有皺紋敲開內仁二瓣中隔黃膜仁形陷起上有紫膜院之色黃白膏潤木草云羌桃方輿志云胡桃始自漢張騫得種於羌胡北產者佳南產者差等其木堅柔造器

植莢揀壳薄無紋者收作種埋地一穴深五六寸入糞二

盆下鋪一瓦井種一枚覆踏泉澆自生用瓦片者
使無定抵異日好移栽也法以實熟者埋濕土中常澆
水使芽生方植宜稀每一穴一枚每穴中先安一牛脊
骨一節着實于骨盤中令芽在上以土覆之後結實凡
人但移種易活難長惟點種者佳于元旦日或開花時
以斧順斫出汁則實不落

收採秋季果熟時或摘下或枝敲積堆微漚去皮取核爲
果脯乾停透風處可久宜常晾恐濕滯否則油膩仁黑
不堪食用

本性味甘氣溫益水滋金多食動痰動氣同酒食令人路
血素有痰火及積熱者禁多食藥性詩云留皮可消滿

去皮可潤血微合鹽食則佳

効方風寒無汗發熱頭疼核桃肉連鬚葱細茶生薑各等
分水一盃煎七分熱服取汗 眼目昏暗四月內取風
落小桃每日午食飽以無根水吞下數粒偃臥覺鼻中
有泥鯁氣効 食物醋心嚼核生薑湯下 宋洪邁痰
疾上遣使令胡桃三枚生薑三片以時嚼服卽飲湯三
兩再嚼胡桃如前數卽靜臥如盲服之旦而疾消除
溧陽洪輯少子病喘甚危急其妻夢神人授一方服人
參胡桃輯急取煎湯一蜺壳忤飲之卽喘定又剥皮服
喘復作仍連皮服信宿而愈



晉書劉涓子云胡桃生西域外同樸肉柔甘似古賢
者敬以爲貢 神仙傳笑夫人與劉涓子俱有道南之

日名曰言勝庭有胡桃樹二株各咒其樹下一咒典
之相闕博良人各還其樹宋書司馬先下兒寺鼓
後桃合姊破姊不典去合姊鼓之其姊問何以鼓日
自敵耳姊責曰小兒時豈可以說誰曰此戒之終身
不敢
勝大

柿

柿圖經云樹高大皮黑恆繁葉大圓而光澤四月間白黃
小花結實生青綠熟黃紅形有大小圓扁尖直有朱柿拾
柿著蓋牛心蒸餅八稜鹿心鷄子之稱大者如硃次者如
拳核扁若木然乎而堅實固謂之柿盤采之烘淋作果造
製可以致遠西陽雜俎云柿有七絕一壽二實三無鳥雀
四無虫蠹五霜葉可玩六佳實可啖七落葉光大可以臨
書柿乃朱果也故字從弔韓詩謂之虬卵張仲殊謂之絳

蠟梵書謂之鎮頭迦乃北方滋甘果也

植執尖生者爲枰栳木草謂烏枰草木狀云漆栳又名赤棠稗乃栳之小而卑者實大如杏生青熟黃綠用百人宜食之青者攪碎浸汁謂之栳漆可染單傘蓋扇諸物以美枝栳接其味佳美廣志云軟栳一名輓棗小栳也肌細而味厚其木類栳葉長實小生青熟成紫黑可按栳又種實小圓如指頂者接栳尤美冬初以軟棗枰栳下種待長移我連接兩次者無核三接者爲主花書云枰枝接則成金桃

製栳栳雖紅熟溫味猶存摘下置器中自然溫除味甘如火烘成淋栳用水一釜置栳于內數日即熟亦有鹽藏

者又有灰汁澡三四次去汁着器中可入食造柿餅
大而美者刻去皮捻扁日晒夜露至乾納甕中待生
霜一名白柿一名柿花烏柿者置炕上以火燻熟而成
造柿糕糯米一斗淘淨乾柿五十枚如乾煮棗泥法去
核和拌之蒸熟食甘美造柿酒糯米合柿蒸熟入麴藥
亦同造酒法水酒火酒皆宜

本性味甘氣寒潤燥生津去熱化痰柿霜治喉古最良生
者多食引痰乾者多食動風同蟹食屬寒作瀉食柿飲
熱酒令人易醉或心忪欲絕

効方痘入目白柿日日服之 解桐油毒以乾柿餅食之

胃弱食難消化面起黑暈者用乾柿二斤酥一斤蜜

午斤酥蜜煎勻下桶煮十千沸以磁器停之每日空心

食三五

典故

東觀漢記韋順仁孝有桶生屋上徙庭中遂茂時人
以為有感和氣而生○世說鄭虞家貧好典書若無
叔亭停桶某爇屋肆書歲久殆遍○山堂四考湧山
禪師與仲山遊行烏舍一箱日墜前仲山以水洗淨
典湧山分半而食之

銀杏

銀杏圖經云樹高大材至連抱葉若鴟掌有刻缺而緣背
淡白二三月開花成簇青白色三更子時旋花旋落人不
能見結實繁多狀如小杏色青經霜乃熟黃臭瀾收臨水
淘去外腐肉收其内核色白形兩頭尖中圓大而扁二稜
者為雌三稜者為雄殼中仁黃綠色炮之可果其木耐久

肌理白臧術家刻作符長能致鬼神堪輿制爲羅盤以定
子午北人所爲白果南人名爲靈眼宋初始入貢故稱銀
杏

植莢莢宜雌雄並植或雌樹炤影于水邊可結實若不結
實者或以鑿孔納結于水一塊泥封之卽結致富書云
春以子種肥土生二三尺可移栽老山農云掛枝潤土
亦活歡食糞出者收種易生且茂

本性味微苦氣平生食辟痰消毒熱則滋血爽氣但多食
動風三元延壽書云白果若啖滿千粒必殺人小兒九
禁食須去心杏令人痢瘡同鰻鱺食冷軟風

効方小便頻數者白果去壳七生七熟頭食之取効方手

足織裂膏生白果夜夜塗 赤白帶下元氣虛憊白果

蓮米茨茹各五錢胡椒一錢五分為末用烏少鴉二隻

剖搗去臟裝藥人內磁器熬爛空心食

典故

一統志蘇倚汴人盜此樹示南渡過且山拆自果一枝

插地而祝曰弟此枝復活吾于此卜居焉其後果心
先成倚因居此後成大樹繁枝珍屈一葉如乳者凡
七八十顆相傳為子孫嗣世徵兆之樹則人乃異之
為通有樹

梨

宋圖經云樹似杏高丈八葉亦若杏微厚大而硬色青光

或毛加斑點二月開白花若雪故吉人為陽去白雪者是

也上巳日無風其年家佳花癰圓舒者生果甘美決癰者

生果酢堅色有黃白青紫形有大小圓扁錘面熟有秋夏

味有酸甜名或呼產地或稱色象梨者利也曰美梨
也廣志云快果本草云吹乳果譜爲蜜父又名果宗雷雅
疏在山曰糖人植曰黎五季紀云馮道始製削剔以木鐫
文字割書圖勝手他木也

植莢擇味美樹頂者果熟收全埋潤土至春生芽苗成至
春分移栽多移更佳至冬閉土刈之以火燒頭三五年
茂者摘生及種而不栽者則結子遲每梨有十餘子惟
一二子生梨份皆成杜又法于春分前後十日取田梨
箱如拐樣截去兩頭火燒用器烙精脈臥栽十地可活
梨性喜接味美無渣取棠杜如磨以上者接之大者三
四枝小者一二枝取美果向陽嫩枝貼之若路遠取貼

枝枝根下燒三四寸可三五日猶生所按之枝生苞須用箸護畏恐遭象鼻虫爲蠹

藏梨初霜卽收于屋下掘窖底令無濕潤人梨在中不評復蓋便可經夏摘時勿令損傷但梨身頗有微痕卽腐須揀去之綱目云梨就樹上以囊包裹過冬摘佳物類相感志云梨與蘿蔔相兼收或削梨蒂挿蘿蔔內藏可經年不壞王楙云亞處取甜梨去皮作厚片火烘乾謂之梨花充爲佳果凡味酸者澀者換水煮味甘不損人本性味甘氣寒涼膈潤肺消痰降氣胃寒人禁食效方傷寒瘟疫已發用梨皮甘草各一兩粳米鍋紙煤各一錢共爲末每服三錢白湯下日三服效

反胃轉食諸

物不下大美梨一枚丁香十五粒刺梨八丁香五粒色
裏濕煨食 長樂集一士人慨○無聊往医診曰子三
年當發疽列士人懷憂去乃僕衣詣茅山願執薪水役
道人留置弟子列火之道人乃命診笑曰子爲瘵來士
以實告道人曰日啖梨一顆如無生梨以乾梨煎汁飲
煎食食病自當平土如其戒經一歲後見老醫診脈息
平和驚曰必遇異人不然豈有痊理士告以故医拜服
典文士傳孔融年四歲與諸兄金梨轉取小者人問其
故各目我小兒時當取小者○唐書蕭記常夜坐石
上及弟等同年生時融時未化之絕較上自惟梨
以賜之融子曰臣等請融以我他年故事上言之題
王曰先生年歲尚顏色若童兒信王曰夜抱九仙骨
日被一品衣一士曰不食千鍾粟惟餐兩顆梨士曰
天生此間氣助我化無房○唐書武后時秋出梨花
以示草臣皆賀惟杜景全獨曰陰陽不和相奪倫漬

財爲災故曰冬無行陽夏無依陰春無淒風秋無苦
詩今草木黃落而梨花復續陰陽也○廣類賦侯穆
有詩名因寒食郊行見數少年共飲干梨花下穆長
和就生衆皆哂之或曰能詩者似以梨花爲題穆信
山而成衆
皆關筆

柰

柰圖經云葉似梨而尖小二月開白花成掛結實白者爲
素柰赤者爲丹柰青者爲綠柰夏熟後櫻子秋熟爲楸子
有冬熟者祭法曰夏祀用白柰秋用赤柰西京雜記云土
林有紫柰紫柰綠木不綠花山海經名曰櫟陽華之山有櫟其
實如瓜食之甘美柰字象子綴于木下之形也

植欝冬取樹下小柄枝條栽滋土至春芽生雨水移栽易
生壓枝脫枝更妙以舊果材接佳美

製棗果熟收納瓮勿令蠅入六七日待爛以酒淹痛拌如
粥再拌濾去皮子澄去清水傾布上以灰裨引汁盡劃
開日晒乾爲末可以治果能致遠家塾云每百枚取二
千枚搥碎入水煎候冷納器中入此八十枚浸之密封
甕口以浸着爲度可留久

本性味甘酢氣寒多食寒肺反滿病人尤忌

效方熱痢腹疼者以棗取汁和生蜜飲

無名

孝子傳王昨事後母庭有桀始者使守附書驅鳥雀
夜驚風時雨忽至前抱樹至弦可見朝然而感○典
畧楊樹幼時家有桀樹實落干地羣兒咸爭拾得生
不顧其季父時見之日此身枯裕有大人風

黃果

黃果乃柰也西北產者最豐樹身從直葉林檎相似果似

梨而圓滑生青熟紅或半紅半白光澤可愛流香數步味
 甘鬆未熟者若棉過熟者沙爛惟八九分熟者最廣志云
 西方收明片係臍數十斛以為蓄積名蘋婆樹充食以代
 穀

植蘇春初分樹根下小枝條植土中以潤為準即生檣櫟

楸填接則佳

收藏秋果取畧熟者收水窖中至夏月味凡美秋月切作
 片酒乾食亦佳又云凡果連枝並留寸餘大香油瓮內

經久出油如新

本性味氣與柰同不過別其大小色象稱名之異耳

南岳夫人傳神夫人名聖存至冬夜
 有黃人降夫人設酒設饌玄雲此果也

杯榆

杯榆圓經云葉似梨樹不高大仲春月開粉紅花結實碧
紫而差圓六七月熟淡紅可愛稱爲花紅甜者早熟脆美
酸者晚熟較脆色有水蜜金紅三色果可脯乾研末點湯
方土記名蜜菓本草云冷金丹通兩云始生渤海間其味
甘能召鳥謂之來禽又名杯禽

植蔬兩水前後取根下條栽頻澆易活以柰接更美柑感
志云杯榆生毛虫以蚕蠶理樹下或以洗魚水澆之生
蛀虫錯樹以樹線釣之着百部末或理獺狗尸于下不
生蛆虫凡果樹皆然

藏收便民圖云桃杞楊梅杯榆等果用臘月水薄何葉一
三農紀

握明礬少許入釜內投果于中顏色不變味更清涼

本性味甘氣溫下氣消渴生食發痘多食膨脹得嚼其核

即消

効方清異錄云林擒百枚蜜浸十日取出別人蜜五斤丹砂夫二兩拌攪泥封一月出之陰乾或飯後酒時食一

枚甚益各冷金丹



唐書高宗時王季謹得五色果似未柰以貢上上大悅賜傳文林郎今因以爲文林果○名妓傳守令饒客不以林擒有中外使即袖歸云宜進于上守令櫻欲微飲時官妓作酒糾在旁立自守令曰此物芳脆乎搗必損何能入使便還果潰垂之矣守令嘉其氣召妓厚賞之

櫻桃

櫻桃圖經云永蔭不高春初生葉圓尖而細齒門山花繁

若雪氣馨如蜜結子一枝數十顆如珊瑚博物志云大石
如彈丸生青熟鮮瑩深紅者爲未櫻又名朶果紫而肉內
有紅黃點者爲紫櫻黃者爲蠟櫻小而紅者爲櫻珠諸果
之中惟櫻先熟禮記謂之含桃月令謂之荆桃爾雅謂之
櫻呂氏春秋屬鳥所食故謂含桃呂氏本草謂麥英鬼容
于謂莽蜜櫻者實小而可愛故字從嬰也

植藝春初分樹下兒條栽澗土中頻澆卽生須知陰陽向
背核種亦生不若植條之速利

護防熟時須張羅網以驚鳥雀更置葦箔以障風雨若經
雨虫自丙生人莫得見須以水浸良久虫自丙出

本性味甘氣溫美志固精多食令人吐舌濕熱病喘嗽者

忌食小兒更禁

妨方面生班野者櫻枝浮萍牙皂白梅和煎洗

典故

漢書惠帝出離宮叔孫通云吉者春嘗果今櫻桃可
獻願出以獻宗廟上許之獻諸果自此始○唐書李
希烈死其子不發喪謀誅諸將自立承夫有獻櫻桃
者希烈所強娶竇氏女請分攜與陳仙奇因以蠟鼎
九雜果中也所謀仙奇大驚率兵入斬之○唐書李
林甫採蕭頌士各欲見之時頌士居母喪卽緩麻請
人見子故事省林甫矧不識達見大惡卽令折去頌
上作櫻桃賦以刺之○花史張茂卿類事聲伎一日
櫻桃花開携酒其下口和
粉風流無喻此君乘屏夜步

石榴

石榴圖經云樹不甚高阿附幹自地便生作叢葉綠梗紅
夏間開花有大紅粉紅黃白四色有酸甜苦三種千葉者
不結實單瓣者旋開旋實花投成實實圖若越頂有尖飛

大者如盂小者如卵皮色斑點經節則實自裂中如蜂窠
有黃膜分隔子列排牙白者如水晶紅者如寶珠淡紅潔
白者味甘深紅者味酸廣雅名在榴廣志云月榴一名金
罌一名金龍本草二天漿始產塗林安石國漢張騫使西
域得種入華故名安石榴也

植執榴子可植不若植枝易尚春生芽時折嫩枝長二三
尺者以火煨折頭環屈爲一窠掘穴納內留枝稍大餘
填以牛馬骨土覆之築令堅性喜肥嬌以濃糞澆卽生
當花實時至午對烈日澆之佳

嫁榴不結實或結而復落者須以石塊安枝杈中或壓根
卽結實可不落

留榴此時揀美者連枝摘下安新破缸中以紙密封十餘重蓋之至春取出猶新

本性味甜氣寒潤燥多食生痰損肺黑齒服餌家忌之味酸者能斂氣殺虫陳者佳

効方疔毒以鍼刺四畔用石榴皮着患處麵圍炙之以疼為度仍納榴末覆上當心裏經宿連根自出

吐血榴花為末吹鼻血自止又敷金瘡出血

典故

廣志一婦時者殺鵝饌如食而死姑女訴官官不能

新臨刑婦折榴一技向天泣冤祝曰妾一毒姑花死

若沾是証枉榴後生已而花果更榮時人哀之立答

以表○北史齊子德王延宗納李祖牧女為妃南子

李宅妃同宋氏詩傷薦廣南黃帝黃知具意問于魏收答

日石摘房中多子王新婦飲子孫象多耳帝喜賜以

美錦○花中州東山唐魚者監起遂二鹿人石門內有鷄若人烟見一翁曰此辟秦地也子有緣能出

平惟名有云歸別乃夾與留花一二枝出復再動而止○
博異記崔元微遇數美人陶氏李氏有絳衣小女名
石醋醋又有封家上六姨來石醋醋曰諸女伴皆在
苑中當求十八姨相庇名處士每歲日作木橘圖日
月五星則免崔詩之其日立橘忽東風大起苑中花
木端肅不動方悟美人乃衆花之精

橘

橘園經云樹高丈許枝多葉繁臨冬不凋葉若積而添綠
光澤幹生芒刺而膚青四月開白花清香結實生青熟黃
實大如杯包內有瓣瓣中有細核味甜者爲蜜橘味酸者
爲盧橘乳橘形扁者有蓄橘芳橘形小者有朱橘綿橘砂
橘形大者有穿心橘皺膚者有荔枝橘早熟者有預黃橘
秋花者有冬橘輯彥直作橘譜三卷別種十四以詳其大
義橘從葡萄者雲色也橘實皮赤瓤黃刮之郁紛有似荷

雲之象故得名也春秋斗星樞云璇星散而爲橘呂氏春秋云江浦一橘漢士之巷所以致之漢書云江陵有千樹橘其人與于戶侯等

植藝考工記云橘踰淮化枳西北少產東南盛焉熟時擇美者作種連皮理肥潤上中春深生芽苗高尺餘移栽相離三步一株冬間須以濃糞壅培則花實並茂可厭脫得速利宜接貼則甘美

范橘孫漢陽十月以薪草博樹爲木奴着裘遇旱以米泔水灌之瘞死鼠則實倍相歲志云橘見尸而實繁漚盤經云如橘見鼠其果實多多能鄙事云培灌橘以茅灰和羊糞壅之多生實十一月內將根寬作盤澆大糞三

次至春澆水二次花實更茂忌言猪糞正月內修其
枝折幹枯碎者以利刃斫之至木平齊又刪其枝之卷
葉細看蛀孔以口黃塞之將杉木釘封其穴花開時收
取草藥燬刑薰之實不生蛆或以猪膽截分寸餘懸枝
上亦不生蟲或收山間大蠧蟻焚其桶根下可逐出也
樹下不得荒蕪宜鋤去草淨爲妙

收藏便民圖云十月將橘入錫罈內或以芝蔴雜之經火
不壞橘柑之屬藏菜豆中更妙石近米卽壞多能離事
云鋪乾松毛中不近酒處多不爛以白糖充實感漏名
橘餅

光州味甘者潤肺酢者聚痰生痰益人蜜煎糖充乃佳

醬淹作茹多食生痰同解食令人患煩作痘花收三本
人茶清香

幼方男女傷寒一切雜病嘔噦手足逆冷者以橘皮四兩
生薑一兩煎服一卒然失聲者橘皮五錢水煎徐呷
卒然食噎者以橘皮一兩水半盞煎熟服女人產後尿
悶者此方神效



孝子傳 廬陵王靈之喪父月二十年臨醮不入其口
庭中橘樹時冬三實○吳志陸績年六歲見袁術而
山橘結懷三枚拜術橘墜地謂曰陸郎作賓而懷橘
子績云欲歸以遺母術奇之多贈○晏子春秋晏子
使楚楚王逆橘置前晏竟並良不剖王曰橘當剖對
曰臣聞賜人者推瓜挑不剖相橘不剖召無教臣
不敢剖非不知也○雨怪錄已人家有橘園得一橘
如三斗盛異之剖開有二隻須有皓然相對戲象
要三橘中之樂不減而山但不能
深恨固帝為八壇下焉畢認不見

柑

相圖經云樹高丈餘枝青葉綠四時不凋其樹亦綠但身無芒刺性畏冰霜實亦如橘圓大味甘生青熟黃比橘皮稍厚紋理稍粗而無苦味實易貯敗瘴彥直云柑別種有八古今通柑形如榴者爲壺柑方上記云黃者頗者謂之胡柑左傳云甘心快意字從甘者言其味悅人口色悅人目氣悅人鼻譽悅人耳乃透人之甘果也劉基爲柑者言異心有喻也廣雅云瑞金未經霜少酸一經霜後始熟味甘以味名也從木者韻義柑乃治馬之物一種金柑生南土樹亦綠不高大結實大者徑寸小者若指頂形長而皮堅秋冬熟生深一熟金色味酸甘其香又各金橘一名給

蜜糖造蜜煎其作橘譜云西北人不識景祐中始至汴
口成后唱之遂貴一種甘之至小者名金豆木高尺許實
如櫻桃生青熟黃形圓而光溜皮甘味清可蜜漬一種佛
手柑樹似柚而葉尖枝有刺結實若人手指狀長近尺餘
皮若橘柚而厚皺光澤生青熟黃香氣襲人置衣筒中雖
枯而香不歇可糖蜜裹果提蒜罌中香更充溢皮洗萬葉
衣其奇一種香櫚一名枸櫞乃橘之屬也實大如木瓜皮
若橙而光澤乃朱棗之次者置表然罌中經旬猶香可蜜煎
國有雀巢方開花結果

植蔬收實美頂生者熟時去皮分瓢瓣植潤土中春生苗
去草淨冬加棚蓋以蔽霜水待苗長二三尺許移栽成

行滯培修藏忌宜 知橘按以枳橘堪美

本性味甘氣寒調中解熱多食令人胃冷生痰

効方產後肌浮甘皮係酒服效

典故

後漢書引磐為淨陽今嘗餉一盒廿其子年七歲服
一枚磐奔付外卒四私以枚與兒磐見怒鞭卒何故
行賂于吾子也以私而廢公竟以枚出人皆權服○
梁書呂留珍性共少儲當楚中成幕者不收解衣解付鄒
座解氣荀躬果食未嘗動節嘗醉渴取一廿食武吉
美謂曰卿今自便足九有所進尋外合月給錢十萬
文○述異記南康郡康望山真有果林成列整齊如
人功也廿熟時自三人造之食至飽懷二枚以示
回旋半日述不得歸問空中語云服儻之相
乃攬汝去懷者瑤瑤置地轉盼即見歸路

橙

橙圖經云樹似橘有刺其似柚而香大者如盤經霜始乾

向帶犀紋色若鶯脰雖刻缺如雨斷實可薰衣可茗餅可

申茹醢爲醬醢可糖餠蜜煎可和湯待賓客可解酒速醒
韓彥直云橙種有五十士記名振子廣志云金毳南方草
木譜云鵝壳理雅云柚屬也大橙而成故字從之列子云
吳越之間有木焉名櫟樹碧而冬青實丹而味酸食其皮
汗已積厥之疾人淮北化爲枳乃地氣之不同也

櫟實熟時收美者種潤土中出生一二尺移植成
行培治如橘相法能接換實美

本性味酸氣寒多啖發虛熱傷肝同櫟肉食患惡心頭旋
皮消食下氣和鹽止惡心療酒癖

効方寬中快氣消宿酒 去胃風搔皮二斤生薑五兩汁

兩檀香五錢共末和餅鹽湯下



唐書云實其美亞
 以地氣有殊物性
 林結實乃寅治南
 丹陽守尉治家妾
 種甘橘檢柚等各
 官財治家故窮如
 食每歲土一疋日
 及相成每歲得經
 于正

聖德寺開江南房攝江北房以
 因受朕近于宮內種日橘
 菊道所進無別一囊賜記李
 鞠不聽密道人于龍陽洲上
 于樹臨死勅見日汝明清
 是吾洲上有于頭不收不
 走矣

楊柳

楊柳圖經云樹若荔枝
 生核土生青熟有紅白
 紫三色紫勝紅紅勝白
 五月熟或
 出漬糖製鹽藏火酒浸
 皆在方士記云桃子冥
 物志云火
 實如彈丸正赤五月
 熟其味甘酸博物志云
 地有草名
 則生楊柳潛雜類云楊
 州人呼白者為聖僧亦
 乃方果也

理北姓喜山土實熟收
 移浸其池內一月取出
 入潤土中

至明年春中苗生待長尺餘二月移栽多留宿土易活
至三四年生子冬間離根三四大隙澆以灰糞塵結實
大而肥相感志三桑接味甘擇本樹佳者接亦美

治樹樹間生癩以甘草釘之即去生蛀虫用百部末填虫
自死

本性味酸氣溫逐痰止嘔仁可除肺多食生熱久食傷胃
忌與生葱同食

効方風虫牙痛楊梅根非根系上垢等分提勻貼兩腮十
其中自口角出一頭痰不止楊梅為木諸鼻取嚏效一

藥錄

南史王僧虔之性孝庭中楊梅隆冬三熟時人以為孝
感所成○深書在助傷折安大守即有二碩牛因梅
舊為太守所采斷剪音哈步物即時停止○日蘭得
楊梅種年死楊孔君平謂其素具受設果有楊梅孔

出未之曰此君家果也卽德声
各曰未開孔雀是夫子家禽

橄欖

橄欖圖經云樹似木樨高大端直枝皆高聳葉如樺柳二
月開青白花結子狀如長棗青色兩頭尖先生者居下後
生者漸高深秋方熟其核兩頭尖而有稜內開三竅亦有
三角四角兩瓣核者蜜漬鹽醃可久藏唐志云青果南方
草木狀云出果勢譜云諫果乃方果也產百越沿海浦島
溫煥處木作櫟撥皆得魚魚遇若死便不能動故四兩以
可伏千斤流魚

植蔬土宜處核落卽苗隨栽易茂但性畏寒宜于冬時以
葦草縛梗至暖時去之易茂果熟時以木釘之根皮肉

丙納鹽少許一夕自落

本性味酸甘氣寒開胃理氣止渴解酒生食煮食並生津

香口凡食此果去兩頭多食致土壅白露後食不病瘡

効方小兒初生落地以橄欖一枚燒研末入硃砂五分和

勻嚼生芝蔴一口唾和藥結包如棗核大安兒口中含

啞一時頃方可與乳食除胃臟毒合兒少病出痘稀



自述一日春時與友朱韻清遊邑章山程夫子既道

人設茶果有橄欖韻清曰可能識此味乎予曰不知

也韻清曰不見夫蘇東坡詩云但得微甘回齒頰已

輸崖產十分胡予曰已聞諸蘇吟子可能曉王父之

如始我今何所喻歷口後棄遣良久有同味始覺
天世亂思其言聖臆焉能迫道人日一人言未一
人言性此番神機禍不理會衆大笑
荔枝

荔枝圖經云木性畏寒而根浮樹耐久經數百年猶實高
數丈日徑尺至合抱葉類木樨四時不凋材質堅勁二三
月開青白花狀如冠之莖緩結實喜雙纒生若初生松毛
核如熟蓮子壳有皺紋羅點聚粒貼狀初青漸紅壳裏肉
色淡白如肪玉味甘多津夏將中一樹食然俱亦乃可食
收製可久留蔡君謨譜云丹枝又名離枝品目總三十有
二南方草木志云此木結實時枝弱而蒂牽不可摘采必
以斧割其枝故以名也惟產閩粵巴地乃方果也

稀莖三轉黃圖云土產南北異宜荔枝移丁庭者無一生
焉偶有一枝稍茂終不花實土宜處落核卽生移栽便
活初種五六年時臨冬作棚遮蓋或以草纏枯方四五

十年始花實但根柢浮淺須知固培樹不耐寒一經霜
枝葉便枯至春重發新芽得脫換易茂

來收夏中果熟人未采百虫不敢近纔采摘烏雀蠅螬
然殘傷故采者必于日中而衆采之一經磨身香花實俱
落盛熱時彼地皆燕會其下多食覺熱以蜜漿解之或
以壳浸水服

本性味甘酸氣溫平健氣生液益智通神多食生熱
効方痘不快荔枝煎湯飲 血氣寒荔枝燒存性牛雨

香附炒一兩其爲末鹽湯下 凡癰腫荔枝核四十九

枚陳皮九錢硫黃四錢其末鹽水和麵糊爲丸如蠶豆
大痛時空心服九丸良久再服不再三其効如神凡氣

痛者服屢效



唐類函漢永平年南獻牛荔枝十里一置五正一候
 唐夜傳送唐憲上書云上不以其
 不絕十道至下則犯死亡之
 此近年益壽諸物勿復受獻
 花口而卑香花白而晚梅實小
 可調鼎香則不在乃知天下之
 優于香桃香優于色荔枝無好
 鴨編口若易為忠州刺史為荔
 序荔枝王巴缺間樹形圓團如
 插春榮實如丹夏熟采如荷荷
 膜紫緒瓢對潔白如水雪漿夜
 其實過之若解本枝一日而色
 而味變四五日外色香味盡去
 聞廣人盛稱荔枝為最或以西
 楊宋正平詩云五月楊柳已滿
 味方河朔葡萄重色比瀟江荔
 方之矣○唐書楊貴妃好食荔
 荔枝熟時七日夜至京味色多
 之故曰牧有詩云一騎紅塵妃
 子笑無人知是荔枝來

龍眼

龍眼圖經云樹似荔枝枝葉微小臨冬不凋夏初開細白花生青綠熟青黃七月熟實大如彈丸肉薄於荔枝白而有漿甘而如蜜實極繁作穗如葡萄其性畏寒白露後方可摘食果品以荔枝爲貴品藥以龍眼爲良廣志云海珠藥統志云繡水園方土記比自海人云永彈子草木狀云蝦淚芳譜云驪珠生南海由谷方產果耳

植藝漢武帝云百交趾移來龍眼難以生活偶一株稍茂終無花實產宜之方不易而生茂其樹畏冬須蔽葺其上草縛其梗木大如股方感根下宜加土厚培脫換者易茂

造製龍眼荔枝搗下以梅酒浸一宿撈出曬乾以火烘乾
乾為度以竹籠簍菜裹之成朶者以為龍眼眼餅荔枝
果熟時收其肉以蜜作煎嚼之如槽霜名曰龍眼煎荔枝
枝煎

本性味甘氣溫益神和血安智養氣小兒不宜多食食多
生熱

効方思慮勞心者飲以龍眼薑棗 狐臭者以龍眼核六

枚胡椒三才七粒為細末汗出擦之

龍眼

宋書寇光者居睢水間釣魚為業嘗著冠帶好種龍
眼荔枝其實龍大後不如其終。關中志楊僑妻一

日貴顯婦迎懿以生龍眼夫人不織南果連壳啖婦
日當去充食夫人日聞之龍眼壳可益氣健脾吾家
屢空不能貨耳今得之賚宿疾歸告夫爵爵曰正藥性耳

葡萄

葡萄圖經云蔓本極長春苞萌生葉似荇葉葉大而有五
笑葉葉赤色莖匍生鬚三月開小花成穗黃白色旋著實
九月熟方工記云蒲桃廣志各賜紫萐字從草也始生隴
四五原整里山漢書云可造酒人脯飲之則醕然而醕圓
者名草龍球長者名馬乳白者名水晶黑者爲紫艷造酒
綠色芳香甘烈味兼醕醕根有羅紋可製器甚奇

楠菴春間截取嫩枝壓肥土中頻澆勿活或以肉汁灌或
以糞水澆符結實引架上剪去繁穠子得雨露可肥大
冬月以葺草護之最忌人糞澆以米泔水最良根莖俱
通馨以水澆根至朝而水浸物類相感志云將腐香人

其皮作香氣以甘草刺其根立萎每前地種葡萄雨行
相離三四尺遠掘溝如行深三四尺冬時收蔓莖在內
被以草茸護之至春起架引蔓發生收實澆以糞水中
間空地亦可蒔穀陳省公致富奇書云傍植棗樹令大
將棗樹近根鑽三孔引葡萄莖入過孔中長尺餘候蔓
長滿孔然後斷去葡本截去木稍結實大如棗而甘美
瑣錄葡萄產西域實如胡椒可快痘中土亦有產者一
架間生一兩穗

本性味甘氣原強志生津西北人食之無癰東南人食之
生病延壽書云葡萄架下不宜飲酒恐虫傷毒人

効方胎氣冲心葡萄實煎湯飲卽止根葉亦可○渴煩葡萄

菊提汁入磁器熬稠入熟蜜少許收停煎湯飲口中

執藥赤白障取蔓中水煎過吹氣取汁滴目即去



山堂肆考唐高祖賜葡萄于羣臣侍中陳叔達執而

不食十問其故對曰臣母病渴求難得欲歸奉父

粿聚云大苑以葡萄為酒富人藏至萬餘石人者數

十年不壞故劉禹錫詩云釀成丁日酒味酸五雲第

口漢書云張騫得之西域六帖云李廣破大宛得種

歸張芳詩云聞道乘槎客相携到漢庭何原嘗口葛

先自人菜經人藥者乃要真了也其形厥葡萄但味

辭而實細張騫得者一種李廣得者一種名有種也

甜瓜

甜瓜圖經云蔓生禁大數寸四五月開黃花六七月熟質

脆瓢黃子若稍瓜皮色青綠段經長五六寸大不過圍半

其味甘于他瓜故名甘瓜可薦盤乃云果瓜其味脆美曰

梨瓜草木狀云大曰瓜小曰瓠肉曰瓢附曰環蒂曰蔓其

形異常者勿食有毒殺人

種瓠瓜謂云二月上旬爲上時三月中旬爲中時四月
下時預將生數葉便結瓜者爲本瓜母子候熟葉
截去兩頭留中段取子淘盡晒乾作種種時以鹽水
子合熟糞種仍將洗子鹽水澆之則不籠死種瓜穴宜
深四五寸大如斗納瓜子同種大豆各四粒瓜生數葉
將豆苗稍去鋤勿令草生但鋤不可傷根候蔓拖時稍
去本心令再上不又加熟糞培不動加澆灌以土壓蔓
恐風翻翻則瓜萎勿踏蔓踏則瓜爛若生蟻置羊骨其
傍引而去之

甘氣寒止渴解煩多食動宿冷患足疾者食之難

癰雙頂雙蒂者有毒食多宜飲火酒蒂各苦丁香白者勿用

効方風痰人腦驚癰涎湧瓜蒂炒黃為末酸棗水調服欲取吐加蝎蛸錢牛病濕氣瘡滿加赤小豆末三錢有虫入犬油五六點雄黃末一錢甚則芫荽半錢立吐口一髮禿不生甜瓜塗之口臭甘瓜子為末蜜丸每旦漱後含丸而生歷七月七日取甜瓜七片一直入北堂西南立逐片拭之歷久自成

家語曾子鋤瓜誤斬其根曾皆怒以大杖擊其背曾子仆地有頷而蘇孔子問之告門弟子曰參求勿內也孟子使人請于孔子曰舜之事父母小補則受人枝則先參委身以待暴怒即身如陌野于不義不孝孰大焉史記初平者秦東陵侯秦破為布衣種瓜長安城東瓜美故世稱為東陵瓜也

差為越所敗過去得自生瓜與食之間左右曰是乃
冬有瓜近道無人取何也對曰盛夏暑之時人食瓜
非居道傍遺子復生故人惡食之○梁書郭祖深秋
以清餽有死者餽以瓜祖深報以正帛高人效之皆
利謂深餽而餽安朝野揮之口自述復伏中芸豆歸
妻奉一瓜誤食而帶苦甚妻問曰甜瓜何苦帶平思
曰子乃製婦焉為造物之妙所以占人云其瓜抱苦
帶美東生刺棘利衡固有以貪人還自敗妻嘆云真
先覺者也哉

農書言瓜之要耶

西瓜

西瓜圖經云初生三甲甲間生葉成苗苗長成蔓葉天多
極缺面青背微白葉葉皆生細毛開黃花多疏實生花下
漸長形有大小圓長者有紅白黃色味有甘甜酸淡子有
黃黑赤皮有青綠白斑嫩時瓢堅子白及老瓢鬆子黑托
產者美子形刻劃紋為食瓜剖食甘美解暑止渴純黑純

赤者爲子瓜可剥仁作果蜜製薦茶方士記云寒瓜世人以子多爲多子瓠外地呼瓜子爲馬辛兒始出西域故名西五代蕭翰坡向紇得種歸瓜之美者不若燉煌之產杜預云瓜州產大瓜瓠入其內首尾不見

植瓠瓜熟揀顆大味甘瓠佐者收子晒乾停竹木器內作種勿入左磁皿中則難生生亦等死留種者子母咄人口則形變而味減植宜砂鬆高陽地不宜卑陰土瓜記云西瓜喜牛糞始自人牛糞中移入中國先以牛糞布地耕極熟四而作瀉水路勿令滯水後作穴相離四五尺一窩和土糞壅之周圍留鬆土種子于清明前後時將子先以燒酒浸片時取出灰打味佳每穴止容三四

子相去五六寸許不得復移老圃云種宜稀澆宜頻蔓
宜多苗短時作綿瓠每朝收澆蔓長六七尺須摘去頂
心令四傍發枝至蔓節處以土掩壓恐遭風翻欲實大
美味須俛科揀大壯者止存一顆餘皆摘去若觸腐者
則滿圃盡落宜間植韭蒜葱以辟

逐虫郭璞云瓜中黃甲小虫名守瓜虫食瓜嫩心葉苗難
茂宜于五更時以火照田開壁逼虫自投焚又法以樹
枝連葉一二尺長挿向田中清晨虫盡宿收而抖之或
埋灰

藏瓜瓜半熟時待蔓埋入土穴中勿令損可致來年食經
云瓜割開曝日中少頃食頗涼物類志云瓜近糯米及

酒易敗以猫踏則變砂

本性味甘氣寒除煩消暑竟中下血北人食之無害南人食之成思

也南人食之成思弱也胃寒者忌之食瓜過多以瓜

水飲或以仁煮湯飲或食花亦消腐香少許水調服妙

名山藏任汝寧居令閭戶獻一瓜甚大公異之曰聞之

瓜果異常者下必有奇物往觀令拔根下有蜈蚣數十

瓜遂棄

妙方口病以西瓜晒乾日日服之効

瓜 孝子傳焦華父病思瓜食時仲冬求弗得忽夢一道人云送瓜明子以成孝念華非受貴瓜存于奉父食

病瘥口大帖云臍上系年十五歲母患熱症思食寒瓜主俗不產訪求無瘥俄偶一桑門曰代有雙瓜分

遺其一坑嶽縣求雙瓜中書書高宗子為武后忌賜秒孝敬立奉江上封事自安乃作黃傳瓜病不瘥

人歌之日種瓜黃臺下瓜熟子離離一摘使瓜好再
摘合瓜稀三摘猶倘可曰摘抱蔓歸○齊書郭原平
以種瓜為業遇年大旱鰥寡不復還縣令劉僧秀欲
不漬水與之原平日普天大旱百姓困豈可哉
田之水以通運瓜竟舍夫步白他道○晉書皇甫謐
年二十遊蕩常得瓜輒准叔母曰孝經云
三性之養猶為不孝子今年餘二十日不存敬心不
入道無以慰我因獻欲流涕謚遂成激折節強學○
見開錄呂蒙正微時讀書龍門一日行洛水上意欲
得瓜無我其人遺之後貴頃為相買洛下園地起亭
以陸瓜為名不忘貧賤也○清異錄唐陸贄隨帝遊
梁有龍瓜者帝欲授官陸贄曰爵位天下之公器也
不可失也彼以奉瓜者
長而亡軀命者何勸

勑薺

勑薺圖經云生淺水中二三月出苗一莖直上無枝葉狀
若龍鬚草肥田生苗高二三尺若葱其本白蒟秋後結根
大者如栗臍生聚毛纍纍下生入泥底野生者黑而小種

生者皮薄色淡紫肉白而實大軟脆南人呼爲地栗方土
記云烏苽此食經云烏苽本草云黑三稜廣志云芎古廣雅
云苽苽一物多各因形色土俗之各呼耳

種苽正月留種待芽生理泥缸內三月復移水田中勻種
至小暑前後移栽壅以豆餅及糞冬至前後起之凡耘
耨與稻同

苽連味甘氣微寒消堅除熱作粉食厚腸胃又可濟饑亦
可和肉煮食

効方誤吞銅物及錢環勒齰生研汁飲卽化水 赤白痢
端午日收勒齰入瓶中以火酒浸黃泥封口遇患者以
二枚空心食原酒下 女人血崩以勒齰一歲一粒麝

存性研酒服 遠方之地家多畜蠶以轉外客收利人

中之則死但蠶家聞有勑齊則不敢下

蠶

異聞集一巧宦欲行已邑私恩製劍鑄銅明每日十朝餽早隨以勑齊成其跡日久字消役

人客貨遠方快快間步道亭見一老携一小兒泣行客怪問故曰欠人債以子還客憫以金償債大婦感來拜寓所驚曰我處士俗養蠶致利凡後蠶家不畜雞觀容已中毒矢客怖曰奈何婦云吾家有勑齊食之可白無害

慈菇


慈菇圖經云生淺水中春深生苗青綠莖如嫩蘆有稜中空甚軟每叢中十餘莖葉形若燕尾前尖後岐內根出一兩莖稍粗而圓上分數枝開小白花四瓣而圓蕊內紅黃色根實大者如杏小者如栗色白而莖滑采根製可豢南

人名藉菇方土記云百地栗苗名燕尾草一名剪刀草又名芽槎草一歲生十二子故名如如之慈子也

植蓯冬時拆取嫩芽種田間來年四月移植沃澤中冬采其根以灰湯煮熟去皮乃不麻唇刺喉可製粉霜

本性味甘氣寒有毒除熱消毒久食發足氣病後食損齒失顏色卒食令人乾嘔妊婦大忌

切方產後血悶攻心欲死者及產難胞衣不下者搗一升取汁服之效

西湖記蘇東坡知州州修西湖堤以利民恐歲勞費負不能致久募民種水果于西湖澤中歲收其利以持修堤自是利無窮民不擾擾以水口明細歲荒賊擾水淹煙殘野無手旅近湖民采水果以度命竟以得免

菱

菱圖經云落地易生種塘陂者爲家菱延浮水面葉扁有尖面尤若鏡 莖一葉兩兩相對如蝶翅五六月間花黃色皆向日落實漸向水中乃熟有種無角者皮色微青老黑有種皮嫩而色紫者食之佳嫩可剥食老可蒸煮食曝乾剝米爲飯爲饅爲粥爲果可代糧其莖亦可曝取造飯能度荒年實落江中謂之烏菱冬收爲果生熟俱佳方土記謂小葉廣志謂沙角秦人謂解若楚人謂菱武陵記三角四角曰菱兩角曰菱花開紫色書合齊炕隨月轉移猶葵之隨日升降也

植蔬陳食云重陽後取老菱浸河內二三日發芽撒水

中藥盛時有萍荇相雜卽撈去夏月以糞水澆藥則實
大冬時收其實治食

本性味甘氣寒安中益臟和蜜餌可斷穀

効方鼻時出血藥搗汁飲効



呂覽什厲叔事呂自以爲不見知居于海上夏食菱
英冬食橡栗公自難將死之人曰不知固去是知
與不知無別也厲叔曰吾將以愧後由人主不知其
臣肯也○國語屈到嗜菱有圖召宗老而呢曰祭我
必以菱及祥宗老將薦菱於史命去
之曰天子不以秋飲十回之與也

菱

菱實生澤中春深生藥貼水大如荷皺紋如縠蹙
洲上青紫莖葉生刺莖長丈餘有孔有絲嫩者剥皮可
茹食五六月開紫花向日故曰菱寒菱煖結苞苞外生刺

結爛狀花在苞爾雅云頂如鷄喙肉有斑駁異于鼎鼐然
珠璣壳內白米如魚目薏苡種有硬糯之分方士記謂鷄
頭薏埋雅云雁喙管子云鼎鼐莊子云鷄雍韓退之云鴻
雍本草云薏子俗號水流黃乃水中果也

植薏秋熟收子入蒲包包之浸水內春撒淺水中待葉浮
水面移栽淺水每科相離二尺許先以麻豆餅拌勻河
泥種時以蘆葦插記根所候十餘日後每科用河泥壅
之

收穫秋時收實蒸熟向曝日中取仁可春粉新者可煮食
良須連殼一斗用防風四兩煎湯浸甚軟美經久不壞
本性味甘氣溫生陽養陰淮南子云狸頭愈瘋鷄頭已萎

小兒不宜多食令難長

効方思慮過度勞傷心腎夾黃米一合粳米三合煮粥日

日服

漢書地理志遼東郡遼水出焉東北至海合遼民種水栗秋冬獲果黃芡芡
失食以給所部○樹萱錄張確遊害上自蘋洲洲多
芡芡芡二三葉衣女子携手吟咏遊行于葉上久之
乃能飛去

蓮藕

蓮藕圖經云葉圓知蓋色青光華六月開花花心有黃蕊
長寸餘花褪蓮房成蒴蒴在房如蜂子在窠至秋子堅堅
如石秋冬掘根可食白花者佳可生啖花紅者只可煮食
爾雅云花已發為芙蓉未發為菡萏中替替晨昏開闔其

藥遺其華而其本發落乃莖下曰弱在泥中其根藕而體
併發不偶不生其實蓮其子而前中意凡物先華而後實
猶此華實並生百節疎通萬竅玲瓏亭亭物表生于淤泥
而不染所以李稱而周愛也蓮水芝也澤薺也藥名荷花
各芙蓉一名水芸一名水花根名水芝又名水旦藕名玉
玲瓏品物之貴者

植藕管子云五沃之上生蓮種藕之法先以好美壯河泥
晒乾至春時將塘令乾先鋪腐蘆或敗薦于塘再填河
泥揀壯盛藕有三節者身無損痕者順種于上大者一
枝小者兩枝須宜藕頭向南藕芽向上以硫黃末捲紙
條如簪柄粗纏藕節後用泥次第填至三四寸厚勿露

藕芽日中晒於泥井裂方可少加河水至芽長方可深
加則當年藕成一月一節有孔有絲大者如臂可生啖
次者可爲粉花不者味佳忌生糞恐發熱傷藕大忌桐
油又云蓮實熟時堅黑收實向瓦上磨尖頭令皮薄撒
池中頭重向下自然周正又皮薄易生數日便芽不磨
難生

製食菜豆粉拌砂糖灌孔中白紙扎定入釜內蒸熟斜切
片不脫香美多能鄙事云初出新藕以沸湯炖過入水
浸待冷卽漉出控乾每一大鋸用蜜六兩浸去滴水別
以蜜十如熬令琥珀色入藕令冷收之食美密五六月
采之可爲蔬藕理陰濕地可經久致遠以泥裹不壞

製粉取藕不拘多少洗淨截斷去粗皮浸三衛換水撈出以磁缸內造齒中研爲漿以密羅篩漉無渣令粉沉水清卽瀉去水收沉者攤布上置炭烘乾水晒如遇天晴一日晒乾可碎遇陰雨則勿碎來口又晒名藕粉食益人

本性味甘氣寒平和血益氣除煩解渴節可止血產婦忌生冷惟生藕宜食取其能活血也蓮實交心腎厚脾胃去壳去心作粥食良生食動氣藏器云石蓮子入水必沉惟鹽漬煎可浮此物經山海間百年不壞人得食之令髮黑難老

服食百錄云七月七日采蓮花七分八月八日采藕八分

九月九日采蓮實九分陰乾共為末煉蜜為丸久服不老干葉者服之羽化不飢絕穀方石蓮肉蒸去心為末煉蜜為丸梧子大每服三十九此仙家方也

効方塵芒入目藕搗汁絹裹滴目中 催生用蓮花一片

書人字吞之 勞心費神者蓮子炒去壳留心為末

加朱砂龍眼湯下

化步平安王子 慈七歲母病求時于佛以蓮花獻供

慈觀口皆見河 母護佑其生竟齋如故七口畢其更

慈觀翼中其生 根鬚其母等處口同遺觀其武時海

慈觀翼中其生 慈所蓮東方朔曰此太乙星也口花

慈觀翼中其生 任氏女少奉釋一曰有老仙者持衣

慈觀翼中其生 之溪邊每一漂衣蓮花應手而出口

慈觀翼中其生 年賈道子行則上見其藻眼還開口

慈觀翼中其生 自外珍味並照練梁口事類云元和

慈觀翼中其生 由女自素衣紅面州與甲賜以五

○詩記洛者見二女子碧衣紅裳携手吟蓮叢中云
碧水色川染白蓮香正濃分飛俱有恨此別幾時逢
藕隱玲龍土花藏縹緲容何當假雙翼聲志漸相從
吟罷化雙鰲而飛去○志舒筇二山中客忽崩墜月
水藻生蓮蓮動中一棧綰苞間金色蕊中坐二佛像鄉
人祀述煥動一官心明抗帶刺却拜之佛問曰忘其
怪今人決崔以枯嵬車個中乃一大蝦蟇日吞蓮及
積薪焚之